

在離地面50公尺以上的高度可採集到虫體，由此可推知該虫可在10,000公尺的空中飛翔遷移。另外於1982年7月在茨城縣發現該虫的遷移分散是受颱風的影響。當颱風過後2~3天中，新成虫作廣大地區的擴散遷移，於是造成1983年大面積嚴重災害。

鑑別方法

由於該虫在新侵入地區的廣大水田，虫口密度甚低下，欲發現該虫確實有些困難。但可由下列方法，加以注意調查：


(1)食痕：調查稻田附近禾本科雜草及水稻的新葉上食痕，呈寬1公分、長5~10公分細長線狀食痕。其被害狀極似負泥虫的食痕，但其具有碎白點花紋（如圖⑤）可資區別。

(2)成虫：可在黃昏時，利用成虫爬升至葉尖的習性，用捕虫網網捕成虫。或利用成虫的趨光性，以誘虫燈加以誘集鑑定。

(3)幼虫及蛹：在水稻生育初期，發現水稻生育不良的稻田，拔取稻株，水洗後可發現幼虫及蛹，加以鑑定。

密切注意 以防入侵蔓延

就水稻水象鼻虫之孤雌生殖及擴散蔓延速度與方式觀之，距離沖繩隔鄰的台灣，該虫很有可能附著於漁船、新開闢的大陸交通船或貨物上而侵入台灣地區，更有可能藉通過台灣東北方向颱風外圍環流，由沖繩地區遷入台灣。因此，請全體農業工作人員特別注意它的登陸，適時防止其蔓延，以避免造成災害。■



K-145S中耕管理機


汽油引擎，電子點火，
強力5和7馬力。
操作簡便，省油，好保養，採用安全設計。



◎本機種可辦理農機專案低利貸款。

搭配附件：鐵輪、作畦器、標準刀
用途：中耕、除草、培土、刮畦
施用：開溝、播種等作業。
適用作物：果園、蔬菜園、花卉、蔥、
筍、蔗園、玉米、豆園、
茶園作物。

超級8槽式——稻谷、玉米、高粱 乾燥機




EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

ST-500B型 綜合性貨櫃式乾燥機



玉米、稻谷、小麥、花生
一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)



BL96B

菸葉、稻谷均可
一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊菸層數：二層

順光一心子

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號 經測定合格
TEL: (02)26061111~6(六線) 甲等廠商