



巨峯葡萄因水分與施肥管理不當，導致裂果。



果園應選擇排水良好，日照充足的地方，地下水位較高者應做高畦，避免深耕埋入大量的有機肥料。氮素肥料和高氮有機肥料和雞糞、油粕類應先經堆積發酵，並注意控制用量。枝葉較強者，灌水量也應酌予減少。

幼樹時期氮磷鉀三要素可以平均使用以培養健康的枝條。成樹時期採取氮少量、鉀中量、磷多量的方式使用。堆肥、雞糞等有機肥料和磷肥於基肥

時使用。生長初期至開花前採取氮少量、鉀少至中量、磷多量的方式施肥。開花3星期以前開始輪流噴施硼酸與第一磷酸鈣或第一磷酸鉀的混合液，每星期1次，約連續2~3次。結實後則採取氮中量、磷鉀少至中量的方式施肥。

冬季避免強度修剪，生長期避免強度疏芽，剛要開花前將花穗先端修剪。結實決定後稍加整枝，並隨時注意把枝條位置配置好以爭取日光。

**肥效長久 後勁十足**

## **土壤改良**

**最佳有機質肥料**

**適應作物：**

蘋果、梨、桃、葡萄、柑橘、蕃石榴、  
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、  
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、  
甘蔗、婆蘿、花卉、竹筍、中藥。

泰國

T.C.O.  
**最純正**

**蓖麻粕**

**原裝進口 歷史悠久**

**含有成分：**

氮 6%	磷 2%
鉀 1%	有機物 91%

**泰國蓖麻油工業公司**  
(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社  
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司  
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行  
(036) 663659 張金海 (089) 310417 陳啓明