



為解決北部地區因工商業發達，而使農村勞力逐漸老化與缺乏的現象，桃園區農業改良場在農林廳及台肥公司補助經費下，於民國77年自日本引進一台乘坐式六行插秧機附掛側條施肥機；經觀察試驗，顯示該機在進行機械插秧並作側條施肥一貫作業時，頗適合本省水田施用，尤其施肥效果甚佳，可提高肥料利用率及節省施

肥人力。

桃園區農業改良場特於民國78年3月上旬在苗栗試驗區，舉辦採用乘坐式六行插秧機附掛側條施肥機示範觀摩會，提供農友觀摩仿做。上圖即為示範觀摩會現場一角情形。

(文圖：謝森明)

寶美收

パマッシュ[®] (腐絕60%可濕性粉劑)

特長

- 1. 用量少藥效佳**
每一木屑包(1公斤)僅需添加本劑0.2公克，對綠黴菌即具優異的防治效果。
- 2. 安定性佳**
不受酸、鹼、紫外線的影響，並可耐高溫至304°C。
- 3. 安全性高**
按標示之推薦量使用：
● 絕不抑制香菇菌絲生長及出菇。
● 合乎國家安全容許標準，無殘留之顧慮。
● 對人、畜、魚貝類毒性極低。

香菇
木屑栽培包、段木
綠黴菌等
有害雜菌的防治



使用範圍及方法(農委會公告)

作物名	使用量	施藥時期及方法	注意事項
香菇 (木屑包)	0.2公克/包(公斤)	把藥劑先加入米糠充分混合後，再與9倍木屑充分混合，加以裝包、消毒。	
香菇 (段木)	0.1公克/段木 (或1000倍)	香菇菌種接種段木後三日開始施藥，每隔15天施藥1次，連續3次。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稀釋水量可視當時段木含水量增減。 2. 梅雨後期須噴灌1次。 3. 採收前6天停止施藥。

*每包木屑重量如為1.2公斤，藥量應調為0.24公克/包

藥劑、米糠與木屑之用量愈精確、混拌愈均勻，木屑製包成功率愈高！



三寶油化株式會社 出品
公司地址：東京都千代田區丸の内2-5-2
農藥製字第1050號 台北農藥商會字第78034號



台灣總代理：
台灣興美股份有限公司
地址：台北市仁愛路三段136號芙蓉大樓14樓
電話：(02) 7 0 6 0 6 6 0 - 9