


# 有前途！



Aliette 幹基部注射，或利用抗根腐病砧木嫁接。

主要虫害為果蠅，症狀為突呈星形之裂口，上分泌汁液，乾後呈白色粉狀。防治方法：果實發育早期噴藥，中期以後套袋保護，效果最佳。防治藥劑可以水解性蛋白質加等量25%馬拉松水和劑，加水 100倍噴洒。此外，利用甲基丁香油誘引毒殺雄蠅亦可。

其他較重要虫害為膠虫，可用44%大滅松 (Dimethoate) 1,000倍及50%撲滅松乳劑 (Sumithion) 1,000倍防治。

## 混植，增進結果

酪梨栽培須把不同開花習性的不同品種配合種植，才可能結果良好。如果雖是不同品種，但開花習性相同，仍不能授粉，結果不好。因此，種植前最好先向專家請教，所種酪梨品種的開花習性，以便選擇適宜授粉品種，確保產量。

在酪梨品種中，Hass 是例外，雖種植單一品種，仍可結果良好，但仍以混植其他品種較好。

酪梨授粉媒介主要是蜜蜂，所以開花期間，果園中宜佈置蜂巢，以利授粉，並避免噴藥。

## 防風，仍難免受害

在台灣每至夏秋之時，颱風即不斷侵襲，所以酪梨應選避風之處栽培，並種植防風林來保護。

POLLOCK產期在 7~9 月

### 信用的標誌 品質的保證



各種產品  
詳細資料  
歡迎洽索

#### 棉仔粕

含有成分：  
氮 4.5-5.5%  
磷 2.5-3.0%  
鉀 1.5-2.0%  
有機物 87%

適用作物：  
各種果樹、蔬菜、  
豆類、花卉

#### 海中肥

優肥  
腐植寶  
噴嘴

#### 蓖麻粕

含有成分：  
氮 5.5-6.5%  
磷 2.8%  
鉀 1.2%  
有機物 82%

適用作物：  
各種果樹、蔬菜、  
豆類、花卉

### 六和化工股份有限公司

台北市中山北路三段47號7F  
TEL: (02) 5954321 (轉農業部) · (07) 8717881  
(04) 2545821 (轉農業部)