

## 使用殺草劑 開花前後特別小心

### 殺草劑為害的症狀：

殺草劑的為害症狀因藥劑種類不同而有很大的差異。有些藥劑使葡萄葉脈全部黃化而葉肉則全部保持綠色，有些則使葉片皺曲如毒素病，有些則使新葉黃化如缺鐵症狀。這些症狀都是暫時性的，到了相當時間藥力過了之後，葉片症狀就會逐漸消失。殺草劑對葡萄影響最大的時期是開花前後，此時如果使用不當，往往引起抽穗和開花嚴重不良，而導致嚴重的欠收。

### 原因：

殺草劑之害多數因為噴藥不小心，直接接觸到植株和根部所致。噴藥之後即刻澆水或遇到下雨也較易發生。

### 防治法：

開花前或開花後至少1個月之內不要使用殺草劑。使用殺草劑之後至少10天以內不要澆水。天氣預報可能下雨的近期內也不要噴施殺草劑。最好採用草生栽培法，完全不要使用任何殺草劑。



巨峯葡萄因殺草劑為害，結果枝葉片皺曲，結實不理想。



或第一磷酸鈣 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 混合液，進行夏季的輕度剪定和結實後的除枝和配枝以增加光線，改良排水，避免深耕或使用大量的有機質或未熟堆肥等。採用塑膠溫室栽培，建造防風牆、防風林，或於寒流或霜害來臨前開始用雜草、舊輪胎或重油等燃燒或薰煙都可以減少寒害。新芽或新枝有遭受霜害之虞時可以採取延後剪定或重複剪定方法以減少損害。



## 竹書

介紹竹子的地理分佈、竹子的生長/睡眠/庭園觀賞、竹子分類、竹子開花之謎、竹與中國文化、竹與文學藝術、台灣民間竹製品、竹器製作、日本京都之竹子及竹類文獻介紹等，彩色精印。



每次郵購另加掛號郵資16元  
台北市溫州街14號(02)3628148  
郵政劃撥 0005930-0 豐年社


## 自動控制壓力 動力噴霧機

- ▲ 產品系列
- 果園全自動噴霧系統設計施工。
- 150kg/cm<sup>2</sup>高壓動力洗淨機。
- 免黃油，陶磁柱塞動力噴霧機。

各地均有經銷商  
多種機型·資料備索  
服務專線：(04)3303108~10

免黃油  
水霧系統

新產品



物理

物理農業機械有限公司  
台中縣霧峰鄉吉峰村錦州路449號