

量為低。本省中南部地方適合薏苡栽培，但以高屏地區冬春季最適合。

薏苡對土壤的選擇不甚嚴格，但欲獲得理想的產量，仍須對栽培土壤加以選擇。一般以有適當溫度，不極端乾燥且有灌溉設備的砂質壤土，或富含有機質的壤土最適宜。氮素過多的肥沃土壤，因莖葉徒長，易發生病害而結實不良，不適宜栽植。

薏苡不耐風，如在季節風強的海岸地帶栽培時，應備有防風牆或防風設備。且薏苡忌連作，連作會極度消耗地力及發生嚴重的病蟲害。

省工直播法採用普遍

薏苡栽培有直播及移植2種方法，直播法較省工，所以被普遍採用。移植法因需事先育苗，然後移植，較為費工，但可培育健壯幼苗，且採用最適當的行株距，因此產量比直播栽培增加13.2~28.1%。直播栽培法如下：

1.播種期：在不影响薏苡發芽範圍內，應儘早播種，以確保產量，其播種適期為2月中、下旬。

2.播種法：利用真空播種施肥機進行播種，每次播種4行，行距60公分，株距15公分，每穴2~

3粒種子，每公頃播種量45~50公斤。為預防黑穗病發生，播種前應行種子消毒，其法為利用50%萬力-T可濕性粉劑，稀釋成200倍，浸種3晝夜，或行200倍粉衣處理。

3.施肥：薏苡耐肥性很強，但如施用過多的氮肥容易發生病害。普通每公頃施肥量為硫酸銨640公斤、過磷酸鈣560公斤、氯化鉀290公斤。如有堆肥，整地時每公頃應施用12,000公斤較為理想。施肥法如附表。

4.雜草防治：播種後即刻噴佈45%拉草乳劑稀釋成300倍，每公頃施藥量為2公升，同時混合50%草脫淨可濕性粉劑，稀釋成300倍，每公頃施用2公升。播種後55天，田面如有雜草發生時可噴佈7.3%草霸王乳劑，稀釋成200倍，每公頃施用3公升，用以防除闊葉性雜草。

5.間拔、補植：播種後25天，本葉4葉時進行間拔，每穴留健壯苗1株，如有缺株可利用間拔苗 →

施肥序 肥料 名稱	基肥 (公斤)	追 播種後30天 (公斤)	總肥			合計 (公斤)
			抽穗初期 播種後65天 (公斤)	抽穗期 播種後75天 (公斤)	齊穗期 播種後85天 (公斤)	
堆肥	12,000					12,000
硫酸銨	160	120	120	120	120	640
過磷酸鈣	560					560
氯化鉀	140		50	50	50	290

發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材

愛用者的口碑
就是我們品質最大的保證

煥坤引進最現代化的設備；
最優良的技術；
生產多樣化的產品，
提供您最廣泛的選擇。

● 煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
電話：(047) 773878(總機) FAX:(047) 789778

主要產品：

- 遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從1米~8米，種類最多提供您最多的選擇。)
- 清潔蔬菜用網(規格：16~24~32目，寬度6尺~12尺)
- 溫室專用固定壓條。 ● 簡易溫室零配件之供應。

其他產品：

- 溫室薄膜固定帶
- PE漁網線
- 農工業用硬性及軟性繩索
- 果園及魚池用防風網

進口資材：

- “設施利多”(PET FILM)硬質薄膜
溫室永久的被覆資材
 - ①耐候性特強，使用期高達10年以上。
 - ②具防塵、防霧、防露及不滴水性。
 - ③透光性高達88%以上，長期維持透光性。
 - ④強度特性，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- クリーンエース(PVC防塵膠布)
 - ①比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般PVC布耐用2倍以上。
 - ②規格多，寬度有1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M備有現貨供選擇。