

補充維生素／礦物質

安哥拉兔或一般兔，並沒有關於維生素D缺乏症（軟骨症）的文獻報導，這表示其需要量可能很低。而軟骨症在短毛兔曾被發現，顯示短毛兔對維生素D需要量較高。另一方面，每公斤飼料添加1500I.U.的維生素D，會引起鈣質沈著，經觀察結果，長毛品種兔，遺傳上維生素D需要量較低，所以，飼料中維生素D的補充量只需考慮安全量，而不要過量。安哥拉兔會發生鈣質沈著，和飼料中磷含量有關，所以每公斤飼料乾物質中磷含量必須少於10公克，鈣、磷比例至少2：1（磷不可過高，鈣至少要磷的2倍以上）。

同時飼料中銅含量超過200ppm時，可減少發生鈣質沈著的危險性，此外250ppm的銅使用量，亦可減少腸炎的發生率，其忍受限量在500ppm。不過當兔糞用做肥料時，飼料中高銅量可能會造成問題，因為高銅量會抑制生物生長，損害土壤的生產力。

自行配合飼料時，使用補助飼料是補充維生素、礦物質和甲硫胺酸最實際的方法，維生素和甲硫胺酸可平均地混合在飼料內製成粒狀或單獨餵飼。但不宜採用礦物磚的型式供兔舐食或做成糊狀物來補充，因為兔有非常特殊的偏好，對某些味道有特殊的喜惡，所以此法不能確保足夠的攝取量。

小心使用添加物

將飼料添加劑混合在飼料內，除可發揮其特定作用外，亦可增加兔對某些適口性較差的草料的攝取量。在飼料中添加的抗球蟲藥，通常是在兔飼養於無墊床的鐵絲兔籠，幼兔得到急性球蟲症時才會使用。因為時常投藥不僅增加成本，也會造成抗藥性，且可能由於抗球蟲藥殘留兔體中而危害人體的健康。

香料也常添加在飼料中，以改進飼料攝取量，但是尚未知道那些特定的香料和芳香劑具有此種效果。

施用3號肥，
現在正是時候！

英國原裝進口



3號肥

9-24-24

高磷鉀·高化成——
生理中性複合肥

- 各類果樹基、追肥使用——
柑桔、梨、蘋果、蓮霧、芒果、楊桃、
葡萄、瓜類、蕃石榴、荔枝、枇杷、
檳榔、薔花、萼藤等。

可促進果粒肥大，增加甜度
增進着色，提早採收

- 花卉園藝肥料——
木本花卉、草本花卉、觀葉作物
觀果作物、東西洋蘭等基、追肥使用

- 供應包裝規格：
1公斤、20公斤、50公斤

※說明書備索※



20kg

50kg



嘉泰企業股份有限公司

台北市復興南路一段390號7樓之3 電話：(02) 706-8896