

瓜潛蠅

幼虫俗稱「繪圖虫」

為害情形：本虫寄主廣泛，逐漸成為瓜果、蔬菜的主要害虫，尤其初植瓜株受害最多。成虫酷似小型家蠅，晝間活動，以產卵管刺破幼葉表皮，將卵產入葉肉內，卵孵化後，幼虫一般沿葉脈旁葉肉潛食，葉片呈曲線白色食痕，如同畫圖，俗稱繪圖虫。

嚴重為害時，可導致葉片枯萎，影响植株發育，幼虫老熟後，即於葉背或入土化蛹。其成虫喜食堆肥物質，所以種植前堆肥如無適當處理，往往引來此虫造成為害。

防治方法：目前尚無推廣藥劑防治，可參考下列方法：

(1)預防：瓜苗移植前3天，於植穴施5~6克3%「加保扶」粒劑，覆土後種植。瓜蔓7~9日時，再混合肥料撒施於根旁，每株10~20克。

(2)防治：發生時，可選用80%「二氯松」可濕性粉劑600倍或50%「益滅松」可濕性粉劑1,000倍來防治。

(3)發生不多時，可將被害葉摘除燒燬。

(4)堆肥施用前，混合3%「加保扶」粒劑攪拌後施用。

偽二點葉蟬

肉眼難見易疏於防治

為害情形：絲瓜上常見的蟬類有偽二點葉蟬及神澤氏葉蟬，一般瓜葉較大，而葉蟬體小，肉眼難見，初期發生往往疏於防治，待發現為害時，往往已造成相當的損害。蟬類發生時，常被農民誤診為薊馬來防治，未能對症下藥，促成蟬害的擴起。

成蟬及若蟬皆自絲瓜葉片下表面吸收養分，致使葉部呈灰白色微小斑點，棲羣密度高時，可使葉片葉綠素盡失，而致葉片枯萎脫落，尤其在乾旱季節，愈近成熟期危害更嚴重，近年來本省葉蟬猖獗原因，可能與農藥普遍大量使用有關，因農藥往往殺死了大半的天敵，且易促成抗藥品系蟬出現，導致防治上的困難。

防治方法：目前尚無正式推廣藥劑可供使用，葉蟬發生時，可參考揮用50%「芬佈賜」可濕性粉劑1,000倍，或35%「大克蟬」可濕性粉劑1,000倍，或25%「蟬離丹」可濕性粉劑2,000倍防治，→

吉農牌
JYEE NONG


全省唯一專業化製造選果機

農友請注意
請比較後再買

聰明的農友皆選擇品質優良的選果機，吉農牌選洗果機，本着服務農友為宗旨，專業製造及設計，不斷求新、求變，達到最理想的境界，擁有別廠牌的特點，更擁有別家所沒有的優點，敬請農友在購買選洗果機時，一定要仔細比較，以免吃虧上當。

●銘謝 全省各級農政單位、農林廳、農牧局、青果合作社、各地農會研究班及鄉鎮公所採用。78年度農機補助採用吉農牌水果選洗機200台以上。

●再度感謝 六月間竹崎農會及公所和平農會採購補助21台。



本公司產品外銷東南亞

詳細資料備索

本機榮獲西德專利 G 8812597-1 號
中華民國專利 7520879 號

統農機械有限公司

公司：台中縣太平鄉鵬儀路364號(太平工業區) TEL：2787119·2787583
農場：台南縣東山鄉高原村(李仔園) FAX：(04)2709133