



分級作業每小時可達5,500公斤，精確度達90%以上。

平常使用

1. 使用前應檢查各部裝置是否異常及在動力傳鏈條、齒輪等部位注入油脂。
2. 要進行清洗、分級作業時，應待機械各部達到正常轉速，可避免清洗、分級效果降低。
3. 為提高各級之分級精度，分級桿間隙調整同級之兩邊應一致，最好由同一人作調整。

4. 為提高清洗效果，可調整清洗部出口之擋板壓力，可延長清洗時間。

5. 分級後之果品處理，在採用乾洗者可直接以盛果箱包裝，而水洗者宜用塑膠籃或直接在集果導道之出口依各級以隔板分離置放，待風乾後再進行包裝。

6. 本機分級能量大，通常可多人配合進行包裝，若因人手不足，欲降低分級能量，可調整減少分級軸輸送傾角。

使用後

1. 使用後必需將機械各部掃除乾淨，水洗作業後有泥汙等，應以清水沖洗乾淨。
2. 轉動部位需注油部份，應注入適當之潤滑油脂，機身亦可適當塗上薄層機油，以用來防銹。
3. 收藏時，應待機器完全整理清洗後，加以覆蓋在蔭涼處理或機棚中。
4. 儲藏時，避免將重物直接放置在清洗分級桿之尼龍刷滾軸上。


寶美收

パンマッシュ® (腐絕60%可濕性粉劑)

特長

1. 用量少藥效佳
每一木屑包(1公斤)僅需添加本劑0.2公克，對綠黴菌即具優異的防治效果。
2. 安定性佳
不受酸、鹼、紫外線的影響，並可耐高溫至304°C。
3. 安全性高
按標示之推薦量使用：
● 絕不抑制香菇菌絲生長及出菇。
● 合乎國家安全容許標準，無殘留之顧慮。
● 對人、畜、魚貝類毒性極低。

香菇
木屑栽培包、段木
綠黴菌等
有害雜菌的防治



使用範圍及方法(農委會公告)

作物名	使用量	施藥時期及方法	注意事項
香菇 (木屑包)	0.2公克/包(公斤)	把藥劑先加入米糠充分混合後，再與9倍量木屑充分混合，加以裝包、消毒。	
香菇 (段木)	0.1公克/段木 (或1000倍)	香菇菌種接種段木後三日開始施藥，每隔15天施藥1次，連續3次。	1. 稀釋水量可視當時段木含水量增減。 2. 梅雨後期須噴灑1次。 3. 採收前6天停止施藥。

*每包木屑重量如為1.2公斤，藥量應調為0.24公克/包

藥劑、米糠與木屑之用量愈精確、混拌愈均勻，木屑製包成功率愈高！



三寶油化株式會社 出品
公司地址：東京都千代田區丸の内2-5-2
農藥進字第10502號 台北農藥廣告字第78034號



台灣總代理：
台灣興美股份有限公司
地址：台北市仁愛路三段136號美蓉大樓14樓
電話：(02) 7 0 6 0 6 6 0 - 9