

能配合機械收穫。

8.本品種製豆芽菜，產量及品質皆具商業價值。

9.本品種不抗立枯病及綠豆害虫，故在生育期及結莢期應注意防治。

栽培管理要點

1.栽培時期：播種適期春作2月下旬～3月上旬，夏作6月下旬～7月上旬。

2.播種量：每公頃種子用量為24公斤。

3.適栽地區：適合台南地區及嘉義地區栽培。

4.土壤：避免鹽分過多和排水不良之土壤，如前作物為豆類如大豆、花生，皆不宜，土壤酸鹼度（pH值）以6～8為宜。

5.行株距：春作行距45公分，夏作50公分，株距春夏作均為10公分，每穴留二株，缺株若多應進行補播。

6.肥料量：每公頃施肥量硫酸銨95～190公斤，過磷酸鈣222～285公斤，氯化鉀

83～166公斤，氮肥半量及磷酸肥全量用作基肥，所餘氮肥半量在始花期（播種後約30～40天）作為追肥，但夏作氮肥應視田間肥力斟酌施用。

7.除草：分人工及殺草劑除草二種方法，殺草劑除草，萌芽前可用45.1%拉草乳劑200～300倍噴射，每公頃用量4～5公升，萌芽後可用35%萬帥乳劑1000倍噴射以防治禾本科雜草，每公頃用量1公升。

8.灌排水：播種後約15天，若無下雨跡象應速灌水，灌水至畦面濕潤為宜。開花前（約播種後30天）遇乾旱時，務必要灌水，以免影響產量。在豆莢生長時（約播種後50天）遇乾旱時，應灌水促進充實，但在生長期間下雨時應注意排水。

9.中耕培土：於結莢前，行1～2次中耕培土，可促進發育。

（粉綠豆台南5號之病虫害防治及採收時注意要項，下期刊出。）

施用3號肥，
現在正是時候！

英國原裝進口  3號肥

9-24-24

高磷鉀・高化成——
生理中性複合肥

●各類果樹基、追肥使用——

柑桔、梨、蘋果、蓮霧、芒果、楊桃、
葡萄、瓜類、蕃石榴、荔枝、枇杷、
檳榔、茛花、茛藤等。

可促進果粒肥大，增加甜度
增進着色，提早採收

●花卉園藝肥料——

木本花卉、草本花卉、觀葉作物
觀果作物、東西洋蘭等基、追肥使用

●供應包裝規格：

1公斤、20公斤、50公斤

※說明書備索※



嘉泰企業股份有限公司

台北市復興南路一段390號7樓之3 電話：(02) 706-8896