

刺傷時，該怎麼辦？

接種破傷風疫苗

例如破傷風菌，普遍附著在銹釘、污泥、腐竹或朽木的上面，一旦由傷口侵入未曾接受破傷風預防血清接種的人體內，喪失生命的危險性非常大。由於孩子們活潑好動，常有遭受刺傷的可能，因此現代嬰兒在兩個月大時，就接種白喉、百日咳和破傷風混合疫苗（DPT）。學童入學及新兵入伍時，通常都要再接種破傷風疫苗，在歐美先進國家，少年期開始，每十年要加強一次。

又如養殖家畜的農牧人家，在工作環境中遭到刺傷時，很可能感染到炭疽菌而引發炭疽症，對於傷口的治療非得小心不行。

家畜易感染炭疽菌

另外牛、羊之類的家畜最容易感染炭疽菌，炭疽菌又常附著在牛欄豬舍的木條或竹片上，假使被這類尖銳物體刺傷，傷口感染炭疽菌時，會先長出發癢的紅色斑疹，體溫可高達攝氏39°，然後紅疹變成水疱，水疱中央凹陷是主要的特徵。

水疱隨著腫爛化膿，結成炭黑色的瘡痂，輕微者至此可能痊癒，嚴重者炭疽菌侵入血液，循環全身，引起敗血症，甚至死亡。因此農牧人家之外，屠宰工、皮革工也應特別注意工作時的創傷。

被刺傷應怎麼辦？

被鐵釘（或細小的木條和竹枝）刺傷時：

1.立刻拔除刺入的異物，不要讓它在傷處久留，因為這類異物很可能附著毒菌。

2.用手指擠壓傷口的周圍，使細菌和血液儘快一起排出。

3.不要在傷口塗抹藥膏，以免傷口乾合時把髒物封閉在裡面；只要在傷處滲入消毒藥水就可以，滲入多量的消菌藥水，有助於髒物浮起排出，然後敷上消毒紗布到醫院接受抗毒注射及治療。

被玻璃（或木片、鐵板等大型銳利物體）刺傷時：

1.這類的傷害大多是鮮血淋漓，如果異物沒有插住傷處，以一般處理切傷的直接壓迫法，用消毒紗布按住傷口加壓止血，儘速趕往醫院求治，傷口深大時，可能必須執行縫合手術。如果有一段異物插住傷處，用消毒紗布絞成長條狀，沿傷口周圍壓住止血。

2.不要擅自把異物強行拔除，以免使周圍血管和神經遭到更大破壞，並防止大量出血。

3.用膠布或繃帶把絞成長條的止血紗布固定，不要強行走動，避免異物受壓而更深入或傷口擴大，應由旁人扶助，儘速往醫院求治。

被芒刺等微細物刺傷時：

1.用拔毛的鑷子把芒刺拔除。

2.用手指擠壓傷口的周圍，使細菌和血液一起排出。

3.用消毒藥水滲入傷處後，再用消毒紗布或繃帶包住。如果自行處理後傷口紅熱腫痛，可能是感染細菌而發炎，應求醫治療。