

台東卑南地區今年隧道式洋香瓜栽培面積達10公頃

了子蔓才會長孫蔓，也才會結果。

子蔓要控制在4~5尺長，不能太長，否則枝莖會不健壯，影響孫蔓。

每株洋香瓜留子蔓2~3支，孫蔓留2片葉子後摘心，每一子蔓留2果即可。

隧道棚蓋上塑膠布之後，就不要常灌水了，免得蔓莖長得過於疏、壯。

黃股長指導安全用藥

關於病蟲害防治，植物保護研究室黃股長給農友的建議是：

一・種子在催芽前一定要消毒，消毒方法是以58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑400倍加展著劑CS-7 3,000倍浸10分鐘，然後才風乾和催芽。

二・根據去年田間試驗結果，台東地區的洋香瓜病害種類並不很多，所以希望農友不要噴射太多種的農藥。如果要施藥時，須用政府推薦的農藥，如蔓枯病可施60%得滅寧，若買不到此藥，可用貢芬寧代替。如患白粉病，可把21.2%依滅列乳劑和11.76%芬瑞蔓輪流使用，而且是灑在蔓和葉面上。如有瓜潛蠅，則施用地滅寧或新好年冬。


今年卑南地區洋香瓜栽培面積達10公頃，比去年多了4公頃左右，預祝大家豐收，並賣好價！

新竹畜產試驗所 李善男

乳牛可以配種了嗎？

“RPT”告訴你！

在乳牛管理上，近兩年來，已有一種名為「快速助孕素測定套組(Rapid Progesterone Test Kits, RPT)」的產品問世。此產品包括試管及試管架、試劑(分成A. B. C. D四種)，以及一個判讀器。本套組可以在現場使用，測試時間僅需4分鐘即可完成，迅速簡便，準確性極高。當呈色顯示為淡藍色時，表示助孕素含量高，與黃體助孕素分泌有關；而呈現深藍色時，表示無孕，應注意乳牛即將發情。此種簡便的快速診斷法對幫助酪農了解牛群，把握配種適期有相當大的幫助。



RPT測定套組，易於攜帶至現場使用，每次測試中用一支為空白對照組，用以比較藍色的顯示程度，可用判讀器或肉眼區分。