

→
，在設施栽培更需農藥配合非農藥的方法，一起來做害虫的防治，這樣不但可確保蔬菜的質和量，用藥次數減少，農藥殘毒之虞可消除，更符合精緻蔬菜的要件。要如何配合農藥與非農藥的防治方法，總之可用一句話來說明：做好管理工作。

保持乾淨清潔 配合使用黏虫板等

每種害虫均有(1)適宜的食物（寄主），有的是雜食性，有的為單食性如前面提到的小菜蛾、菜心螟、黃條葉蚤、紋白蝶等均為單食十字花科的昆虫，在沒有這種作物時勢必餓死或逃離，所以在這類害虫猖獗發生時，避免栽種或清除十字花科作物可逃避被害。

(2)有適當的棲所，在空曠或清潔的環境中無藏匿場所，自然無法定居下來，所以設施內

清除不要的殘株敗葉及雜草，保持設施內乾淨清潔是相當重要的管理工作。另外可用有色粘板或性費洛蒙，來誘捕某類昆虫，或釋放害虫天敵等可減少設施內已有的虫體或新侵入者。或種植害虫不喜取食的菜類或生育期較短的品種，在害虫繁殖到某種密度將造成危害前採收等均可逃避受害。甚至可利用紫外線斷除型塑膠布來減少害虫的發生，這點在外國已有達實用階段，本省引進使用成本尚高較不經濟。需使用農藥時，應於兩作中間作土壤或圍籬消毒，配合殘株清除與整地工作效果更佳。

選用殘效短藥劑

蔬菜生育期用藥，應針對害虫種類而選用藥劑如「蘇力菌」對鱗翅目幼虫有效，且無殘留之虞，應是設施內鱗翅目害虫的良好藥劑。另外可同時防除多種害虫，殘效短的「美文松」應可用於短期葉菜類害虫的防治，但需注意藥量不可任意提高及安全採收期。 ■

用藥照標示，經濟安全又有效。

使用農藥要有效，注意安全更重要。

施藥要適時，方法要正確。

請看農藥標示，按照說明使用。

噴藥重藥效，安全更重要。

施藥適時，適量，安全又可靠。