

→，牠也在草地上打滾，讓全身都放鬆的滋味真好。

### 有教養的狗

回到家，香噴噴的飯菜已擺在桌上。對丹丹而言，牠不像一般得寵的狗一樣可以和主人平起平坐。牠靜靜的待在前院，等小主人吃飽飯來餵牠。爺爺雖然好說話，媽媽可嚴格得很，她不准小狗在餐桌旁，更不准孩子邊吃飯邊餵東西給小狗吃。因此，丹丹得耐著心等一等。當牠看到小主人拿著碗出來，牠就自動的跑進狗籠裡，此時小主人會把狗籠的門關起來，讓牠在裡頭好好的吃。當然，在牠吃過飯後，一定要記得放牠出來，否則牠會大叫，表示抗議。要是牠碗裡的飯沒吃乾淨，小主人會指著飯叫牠吃乾淨，牠很識相的會大口大口的把飯吃光光，然後要求小主人打開籠門。

晚上全家人都回來了，丹丹會被允許進到屋裡半小時，牠會周到的和每個家人打招呼，這邊嗅嗅，那邊聞聞，偶而側斜著頭看電視。在小主人要睡覺之前，會把丹丹抱回狗籠，9點左右是睡眠時間，丹丹的眼睛已經有點張不開了，但是實在捨不得睡覺，牠會小吠幾聲意思意思，小主人把它解釋為丹丹在跟家人道晚安。丹丹心裡明白，明天又將是快樂的一天，因此，牠恬靜的進入夢鄉，一覺到天明。

## 子宮外孕的徵兆

新竹蔡小姐來信問：

請問子宮外孕有何徵兆發生？

答：子宮外孕是受精卵著床於子宮腔以外的地方而引起。

最常見的症狀有：①月經週期後有點狀陰道出血。②下腹痛。③尿液妊娠反應檢查時可能呈陽性反應。④內部失血。⑤可能有早期懷孕的徵候及症狀。另外也可由超音波或腹腔鏡檢查而得之。

### 流產過再懷孕時 要避免再發的誘因



哥倆好（阿鳳攝）

新園林小姐來信問：

請問流產過後再懷孕時，應該多久打一次安胎針，又該注意些什麼？

答：流產過的孕婦如再懷孕時，必須先明白前次流產的原因，若是因母體的黃體期機能不良時，則需要定期打安胎針。如為其他原因，則要儘量避免再次發生的原因，如避免過度操勞、舉重物，保持平穩的情緒，避免受到刺激，充分的休息睡眠及均衡的飲食，同時須注意懷孕期中儘量避免性生活。（台灣省婦幼衛生研究所 提供）