

優生信箱

範圍無法由陰道鏡看清楚時，即需要進一步做子宮頸錐狀切除術來檢查。

至於一般人熟知的「子宮頸糜爛」，指的是肉眼所看到的子宮頸處呈現「紅色的現象」，通常子宮頸發炎、機器傷害造成表皮剝落、子宮頸裡外部份外移或外翻、以及子宮頸及癌前期都是原因之一。因此，凡是有性生活之女性每年至少應做次子宮頸抹片檢查。

暴露二手煙下，危險

根據一項新研究指出，不吸菸的女性暴露在二手煙之下，將會大量增加患子宮頸癌的危險，即不吸菸的女性暴露在二手煙之下，患子宮頸癌的危險和吸菸的女性一樣高。

較早時的研究顯示，吸菸和子宮頸癌有關連。癌症研究人員相信，這是因為子宮頸和肺部一樣，長著「鱗狀細胞」，此種細胞對於香菸煙霧中的致癌物特別敏感。

吸菸女性患子宮頸癌的危險性比不吸菸者高出3.4倍。每天暴露在二手菸之下至少3小時的不吸菸女性患子宮頸癌的危險也是完全相同，比不吸菸或不暴露在二手菸之下女性高3.4倍，聽起來很嚇人！對有機會長期暴露在二手煙之下的婦女，自己不能不有所警覺！

懷孕時白血球增加 勿須太擔心

沙鹿王小姐來信問：

請問白血球如過多或過少，不知對胎兒有沒有什麼影響？如有該怎麼辦？以後可不可以讓嬰兒吃母乳？

答：懷孕時，白血球會增加，而平常，一般成年人的白血球數約8,000左右，但如有某些情況發生，如發炎時，則白血球的數目會暫時增加，只要治療得當，大部份沒有問題。因為白血球在體內主要的功能就是當外界細菌侵入時，有吞噬外界病菌之作用，而對人體產生保護。所以妳不用為白血球過多、過少而耽心，更與餵母乳無關。

鎮靜劑吃不得 小心遺禍下一代

龍潭蔡先生問：

內人懷孕月餘，在懷孕之前曾服用鎮定劑數顆，亦曾注射催經藥（鎮定劑之商名Ativan，成份是Lolajetan）請問這2種藥劑對胎兒是否有影響？如有不良影響該如何處置？

答：一般懷孕嚴禁於前3個月使用危害胎兒的藥物，尤以鎮靜劑、催眠劑之類的藥物，雖然藥量是影響產生畸型的因素，但還是儘量不要使用。

催經藥目前是注射黃體素（或合併動情素），在使用1週內如果月經沒來，則表示已懷孕。目前使用這類藥物而發生胎兒男性化的發生率尚不清楚，可能低於1%。