


翻推加水可促進雞糞發酵

問 如何促進雞糞發酵？（桃園縣蘆竹鄉大竹路335巷23弄15號陳鶴鳴）

答 (1)堆積前，雞糞需先與雞糞濕重約15~20%的過磷酸鈣混合（撒混即可）後，陽乾或陰乾（雨期），以供堆積製造堆肥。

(2)晒乾後，純雞糞或混合穀殼者，均可與等量或約2倍的土壤（田土）交互堆積，每層5~10公分。堆積時，並用噴水壺或手，徐徐均勻撒潑，加入30~40%的清水。堆積高度約1公尺，寬度底層約1.5公尺，上端0.5公尺，長度隨意。

堆積後以草袋、稻藁覆蓋（塑膠布覆蓋者，需有隔開空間，以防過熱）以促發酵。4~7天後，待內部溫度高至70℃時，予以內外相互翻堆，並加水10~20%後再覆蓋，如此3~4次內外翻堆酌量加水，溫度即可因發酵完全而漸降，否則延些時日就可應用。（王錦堂）



（阿郎攝）

西瓜葉片發黃之處置

問 西瓜葉片有枯黃的現象，枯黃的部位是由粗葉片至嫩葉片上，嚴重者甚至危及全株。請問這是何種病害？該如何防治？（傅昭東）

答 剪斷變黃之新芽，噴射液肥促進另新芽之生出，可能恢復生育。（黃杉莖）

問 西瓜從第六葉片上開始得了潛葉蛾，應如何來防治？（傅昭東）

答 尚無適當之推廣藥劑，可輪流使用24%歐殺滅液750倍或2.8%賽洛寧乳劑4000倍或40%三落松乳劑1000倍，但留意安全採收期。（黃杉莖）

