

胡敏夫與「台農1號」

/ 蔣任

胡敏夫

1. 民國32年6月12日出生。
2. 省立嘉義農專(二專部)農藝科畢業。
3. 參加台灣省普考農藝科及格。
參加全國性普考農藝科及格。
農業技師考試及格。
- 薦任職農業技術職升等考試優等及格。
4. 先後兩次奉派前往日本文化交流及研習山葵栽培研究工作。
5. 曾參與蘭草品種選育工作，且於民國71年因此榮獲農業優秀人員研究發展二等獎。



胡敏夫先生表示，每年山葵外銷到日本的量非常大，却因為舊品種病害過多，使得產量減少，嚴重的影響了農民的收益。本著農業技術人員協助農民改善技術的職責及增加產量的理念，胡敏夫先生說了句發人省思的話「這是我應該做的！」。就憑著這份自我期許，胡敏夫先生這10年間不斷的往返於省農試所與阿里山及二萬平生產區之間，目的就是希望趕快研究出一種新品種山葵，為農友造福。

談到這次山葵台農一號命名通過後，他有什

麼感想時，胡敏夫淡淡的說：「沒什麼特別的感覺！」，只是欣慰這十年的努力終於有了結果，他也由衷的感謝他的同事劉新裕、邱善英、王昭月以及系主任盧煌勝等人在工作上給他的協助與鼓勵。談到未來計劃，他眼睛一亮，興奮地表示，下一年度他計劃研究山坡地水土保持，他說本省的山坡地大部份由於水保作的不够好，栽種面積相當有限，無法地盡其利，如果水保作得確實，將可造福更多農民。

→ 病及軟腐病等。前述二種病害均發生於葉部，於2~3月間利用動力噴霧器噴佈58%「鋅錳劑滅達樂」可濕性粉劑400倍各一次即可防治。黑心病地上部及地下部根莖均可感染，軟腐病僅發生於根莖，為杜絕此等病害發生，應行土壤及種苗消毒。

土壤消毒方法，乃於粗整地時噴佈85%

「邁隆」可濕性粉劑400倍一次，然後於種植前15天配合細整地再噴施一次，噴佈後為期藥劑滲入土壤，應使用鋤頭充分攪拌並稍為覆蓋，以達消毒效果。

台灣山葵虫害以紋白蝶為主，但為害輕微可用除虫菊3%乳劑600倍於5月間噴佈防治。