

葡萄	露菌病	被害葉片首先呈黃色角斑型，葉背產生白色粉狀孢子，病斑多時易引起落葉，花穗被害時呈水浸狀後枯萎。	任選下列一種藥劑防治： 1. 76.5% 銅滅達樂可濕性粉劑1000倍 2. 72% 鋅錳克絕可濕性粉劑750倍 3. 73% 鋅錳本達樂混合可濕性粉劑1000倍 4. 64% 鋅錳歐殺斯混合可濕性粉劑500倍 5. 58% 鋅錳滅達樂混合可濕性粉劑400倍	劉添丁
枇杷	灰斑病	新葉被害時先呈褐紫色斑點，隨後擴大而呈萎縮枯死。老葉被感染呈角斑型中間有黑點即本病孢子，成熟後突出傳染。花蕊被害呈褐色枯蕊，果粒被害時初期表皮粗糙銹色狀，果粒彎曲，後期呈水浸狀腐爛。	任選下列一種藥劑防治 1. 75% 貝芬普寧可濕性粉劑1000倍 2. 75% 四氯異苯腈可濕性粉劑600倍 3. 50% 免賴得可濕性粉劑1000倍	劉添丁
甜椒	疫病	幼苗、成株、根部地際部及地上部葉、莖及果實皆易受害。被害部初呈水浸狀，隨後轉褐色，高濕時其上產生孢子，分化為游走子而傳播。	1. 畦上覆蓋稻草可以防止雨水飛濺泥土傳播。 2. 可用藥劑防治（35% Terrazole WP 2000倍，70% Previcur N400倍）淋灌菌床防治。	黃秀華

肥效長久 後勁十足



原裝進口 歷史悠久

土壤改良
最佳有機質肥料

最純正

蓖麻粕

含有成分：

氮 6%
鉀 1%
磷 2%
有機物 91%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆蘿、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司
(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行
(036) 663659 張金海 (089) 310417 陳啓明