

椰子	淡圓介殼虫	本虫主要為害葉片，寄生在葉片下表皮，亦寄生在葉柄，果實等綠色部位，被害葉片漸漸變黃，重則乾枯。	95%夏油乳劑混合44%大滅松乳劑以高壓、動力噴霧器均勻噴佈葉背。魚塢旁改噴95%夏油，100倍水。
	扁金花虫 (紅胸葉虫)	卵產在未展開之新葉上，幼虫及成虫均食害未展開扇狀新葉上下表皮及葉肉，食痕呈條狀，被害部變褐，並有褐色粉狀排泄物，其後逐漸乾枯。	施用50%安丹可濕性粉劑並加展著劑以增加藥效，專注於未展開之心葉。魚塢周圍避免使用，使收前10天停止施用。
	犀角金龜	成虫產卵於枯腐椰幹中或堆肥處，幼虫以腐植質為食，原處化蛹，羽化後成虫飛往椰樹幹上葉片基部穿孔，生長點被食害後枯死。	1. 時常清除椰樹保持清潔。 2. 捕捉或毒殺附近腐椰幹及堆肥內之幼虫。 3. 施用5%安丹粒劑每株20-40克，將藥劑均勻撒佈於近心葉之部位。
瓜類 (胡瓜、越瓜、冬瓜、香瓜、西瓜、南瓜)	瓜蠅	本虫為葫蘆科瓜果主要害虫，年發生5-6代，長年皆可見各發育期，卵產於幼瓜皮內，孵化幼虫在果實內蛀食果肉，使果實畸形腐爛，老熟幼虫於土中化蛹，羽化後再飛入瓜園再次為害。	1. 清除園內被害之落果，以免循環為害。 2. 懸掛含毒克蠅香誘殺雄虫。 3. 局部施用25%馬拉松可濕性粉劑混合蛋白質水解物。
蔬菜類 瓜類	斜紋夜盜虫	本虫雜食性，為害作物廣，年發生8-11代，產卵葉背100-400粒成一卵塊，上覆雌虫之暗黃色尾毛，初孵化幼虫群集，啃食葉背葉肉，僅留上表皮，呈透明狀，二、三齡後吐絲飄掛分散，老熟幼虫藏匿土中或雜草間，晝伏夜出為害，土中化蛹，羽化後再次產卵孵化為害。	1. 掛乾式斜紋夜盜性費洛蒙誘殺雄虫，懸掛高度1-1.5m，每公頃2個為宜。 2. 密度高時施用殺虫劑如50%二氯松乳劑，50%馬拉松乳劑，40.64%加保扶水懸粉等防治，注意各藥之安全採收期。



豐年叢書 技術服務

本社出版之豐年叢書，多數為應用技術，購閱後如有實際問題，歡迎來信詢問。
來信請寄：台北市29號信箱讀者服務部。
書籍如發現缺頁或裝釘不完整者，請寄回調換。
需要書籍目錄者，來信即寄。

豐年社 台北市溫州街14號 (02)3628148
郵購劃撥0005930-0豐年社。