



# 台東地區

資料提供 / 台東區農業改良場

台東區農業改良場區內主要作物夏季病虫害防治備忘錄

項 目 (作物名稱)	有可能發生 之病虫害	症 狀	防 治 對 策	執 筆
葡萄柚	潰瘍病	葉片及果實上出現褐色瘡疤狀病斑。	(一)於風雨前後施用鎳乃浦或嘉賜銅等藥劑 (二)果園附近種植防風植並注意清除罹病枝葉。	黃德昌
玉米	葉斑病	葉片上形成淡黃色至紅褐色成紡錘形或橢圓形病斑。	施用鋅錳乃浦，每7天噴洒一次連續3—4次。	
百香果	疫病	葉片或果實上呈現水浸狀斑塊。	(一)風雨前後，施用鋅錳乃浦或鋅錳滅達樂。 (二)注意果園內排水及通風。	
結球白菜	軟腐病	初期呈萎凋後，基部軟腐整株到伏。	(一)注意田間排水及衛生，並防除田間昆蟲。 (二)發病初期施用多保鏈黴素於地際部。	
木瓜	疫病	果實上出現水浸狀小點而後泌膠並於高濕下產生白色菌體，也會發生於地際部。	(一)注意果園排水。 (二)避免種植感病品種。 (三)風雨前後施用鋅錳乃浦。	
蝴蝶蘭	軟腐病	導致葉片軟腐。	(一)避免過度噴藥。 (二)避免密植，清除病株。 (三)參考採用四環黴素或多保鏈黴素施行化學防治。	
玉米	玉米螟	被害處有針刺狀小孔及長條型之食痕，其上覆有如鋸屑狀之排泄物。	釋放赤眼卵寄生蜂。	
番荔枝	斑螟蛾	為害果實呈局部黑化進而整粒木乃伊化可見排出虫糞。	(一)檢除田間被害果。 (二)參考現撲滅松或陶斯松施行防治。	