

		影響，若併發其它呼吸病時，死亡率會增加。產蛋雞感染後產蛋率降低，期間可達1—2個月，甚至停止產蛋。	疫苗使用量為0.01ml，接種在翼膜間。接種後5—6天應檢視發痘率，如發現發痘率太低，應再予接種。在熱季及污染牧場應早期接種，如有移行抗体雞應在3週後再接種。
鵝	病毒性腸炎	本病之潛伏期約3—5日，病鵝初呈憂鬱、垂翼、食慾減退、不喜走動、病鵝聚集、精神萎靡、閉眼嗜眠、縮頸、行動逐漸遲鈍、軟腳、蹲下、側倒或仰反，有時會嘔吐、排出白色或水樣性下痢便，致肛門污穢、羽毛潮濕、腳脫水；另有些病例會流淚、流鼻水。一般小鵝發病後在數小時內開始死亡。	本病可以應用免疫血清緊急預防，每隻注射0.3—0.6ml。種鵝可應用活毒疫苗及死毒疫苗種，活毒疫苗於28日齡接種一次，然後在產蛋前再接種一次，以後在換羽後再接種，以保護所孵化之小鵝安全。

美國進口

濃縮 魚精

開 花 肥

ALASKA MOR BLOOM

0-10-10

有機質配合高效率磷鉀肥

請認明

亞拉斯加

紅人牌

催早花

幫助您的水果提早上市搶先機！

- 促進花芽分化(催早花)
- 促進花蕾肥碩，開花旺盛
- 增加著果率，結實大
- 增加糖度及色澤
- 改善品質，增加產量

讚!!



台灣總代理：**台和園藝企業股份有限公司**

台北市士林區中正路104巷1弄2號

業務處：台北市士林區大南路347號

台北(02)831-6334 • 881-3334

電話：台中(04)222-3374 • 嘉義(05)276-1033

高雄(07)702-3310