2.防治方法：

(1)捕殺成虫，清晨時其飛翔力較弱。

(2)找尋虫穴，以鐵絲或螺絲起子沿其隧道，將幼虫穿射死亡。

(3)以棉花沾殺虫劑（如力拔山乳劑）原液，塞入虫穴，再用泥土封口，使其幼虫中毒死亡。

(4)於近基幹地面施撒10%賽滅得粒劑，每株20～60公克，可防止成虫飛來產卵。撒藥時需戴手套，以策安全。

(5)於4月開始噴佈40.64%加保扶好水懸粉100倍液於主幹（母幹）之四週以防止成虫來產卵，然後每1個月施1次，直至9月。

(四)角蠟介殼虫

1.發生情形：角蠟介殼虫，喜好於陰涼濃密之植株上，故於株齡較大而密植之果園較易發生。每年約於3、6及10月開始大量產卵。初齡若虫尋找新鮮枝條，固定後即開始刺吸取食，經過1天即可覓見其背面分泌淡淡之白臘，隨即進入第2齡。若虫出現期爲3月下旬至4月下旬、6月下旬至7月下旬及9月下旬至10上旬。至第3、4齡時虫體完全被白臘所覆。該虫除了刺吸爲害外，更大量分泌蜜露，誘發煤病，影響葉片之光合作用及降低果實品質。並誘來大量螞蟻影響清潔及令人生厭，爲害嚴重時可致枝條枯萎，影響產量甚鉅。

2.防治方法：

(1)注意修剪使果園通風透氣，可減少虫害發生。

(2)剪除受害嚴重枝條，並搬離現場燒燬。

(3)可依果樹種類選用44%大滅松乳劑1000倍，25%谷速松可濕性粉劑800倍，或50%歐滅松乳劑1,000倍，於若虫未固定初期（3月下旬至4月下旬、6月下旬至7月下旬及9月下旬至11月下旬）每隔7天施藥1次連續4次，施藥時著重於含臘介殼虫上部新鮮枝條噴灑。

(4)噴藥時採用動力噴霧機，以增加防治效力。

(五)膠虫

1.發生情形：本虫在本省中南部1年發生2世代，第1世代11月至次年5月，第2世代4月至10月。每年12月至2月及5月至6月間，稚虫由雌體之肛門爬出後暫時徘徊，後隨即移動群集於新鮮枝條上，經3齡後至成虫期，幼虫固定後並由體內分泌膠質物，粘在樹皮，致使枝條生長受阻，亦影響開花結果，膠虫之排泄物常誘發媒病，間接影響植株生長及降低果實產量

2.防治方法：

(1)採高壓動力噴霧機，於每年初齡若虫發生盛期（中部1～2月及6～7月，南部12～1月及5～6月）選用44%大滅松乳劑或50%撲滅松乳劑1,000倍防治，每隔半個月施藥1次，連續防治至無初齡若虫出現止，施藥時著重於膠虫若虫寄生部位，即幼嫩枝條的下方噴灑。

(2)採果或整枝時，剪除嚴重被害枝條予以燒燬。

(3)膠虫發生嚴重之果園，螞蟻繁殖特別多，施藥防治膠虫時，予以一併防治，可增加膠虫之防治效果。

（下期續）