

仔豬下痢的 治療與預防

問 小豬出生10天左右，就放白糞、下痢，治療效果並不理想，請教該如何預防治療？

(斗六市溝壩里泰安路66號 江武雄)

答 哺乳豬下痢在豬場為一極普遍的問題，嚴重度則視豬場各種不同狀況而異。最常見的是由大腸桿菌 (E·Coli) 所引起的下痢，尤其在母豬移行抗體保護不足，不當的管理，不衛生的豬舍，及其他腸道病原存在時，此病最易發生，也增加治療上的困難。

大腸桿菌病症的發生，在哺乳豬一般可分為：一、敗血症型：出生24小時內不發生下痢即呈敗血症死亡者。二、早發性下痢：泛指出生一週內呈下水樣下痢者，致死率可高達60%~70%。三、遲發型下痢：指出生後10天到離乳期間，哺乳豬發生下痢，臨床上多見白色下痢便；這一類型下痢通常比較容易治療，並且恢復也快，致死率僅20%左右或者更低。來函所指應屬於第三類型。

至於治療效果不理想，可能藥物使用不當(可委請防治所或其他研究單位作藥物敏感

性試驗)。又小豬下痢嚴重者，須實施腹腔注射補充輸液。

至於如何預防，須注意分娩舍內的溫度、通風及濕度，也必須注意是否有賊風。豬舍須定期消毒，空欄時更應澈底消毒，並保持足夠空欄時間。此外，也應強化母豬免疫力，即在母豬分娩前2週及4週各口服E·Coli疫苗。

(中興大學農學院獸醫系 李維誠)

「破布子」之用途、 銷路如何？

問 一、本省栽培「破布子」地區在何處？

- 二、栽培「破布子」有無前途？銷路如何？
- 三、本省何處設有專業區？
- 四、有無栽培上之參考資料？

(台北縣林口鄉竹林路326巷22弄10號 林金田)

答 一、破布子又名樹子，昔日農家常在自家附近栽種數棵以便加工製成醃漬食用，今因時代變遷或因房屋翻建而逐漸棄之。但一般在比較鄉下的地方，也許可見得到。

二、就所知目前破布子因含高纖維，不僅在國內受到重視，也得到日本的青睞，其前途可盼。

三、本省目前尚無專業區，但就栽種面積及數量而言以南縣左鎮最多，而且目前正擴大種植中。

四、栽培參考資料可逕向左鎮農會莊總幹事洽詢，電話 (065) 731716

(新竹食品工業發展研究所 趙傳銘)

仔豬抵抗力弱，易染上各種疾病。



桑椹落果，葉片生黃斑，該如何防治？

侵入果實，造成果實呈現乳白色木乃伊狀而無果實可收，預防方法是清除周圍雜草，並改善土壤酸性轉為中性，或抑制土中病原菌即施加石灰等。

(台灣省蠶蜂改良場 林洋三)

問 不知為何桑椹葉會生黃色斑點，著病的果樹新長的樹葉變小且易掉落，不知是什麼病害。該如何防治？用何種藥物？另外果實也會著黃斑、產生落果。

(台北市信義路5段150巷475之15號 蘇永玻)

答 關於桑椹的病害，茲答覆如次：
一、桑椹葉會生黃色斑點，最常見的是銹病，嚴重時形成黃化落葉，至於銹病病原菌的孢子很容易飛散，侵入葉片、枝條或果實後，在濕度高、溫度又較低時造成病害，防治的最佳方法是「預防」，即早期將病葉摘除燒棄，以避免第二次感染，防治藥劑為「銹克」4000倍於發病初期使用。
二、桑椹最常見的病害是「菌核病」，但僅



防治桑椹病害，應早期將病葉摘除，避免第一次感染。

“施利耐®硬質薄膜”

完全透明!

適用於——
大型溫室側面捲起式側窗

強健耐用

不變形

不沾塵

三菱 園藝浪板

具有(a)透明(b)不破裂(c)不易變色等三大要素

連絡處：

桃園：鈺山企業 (03) 3256052

台南：千葉園藝 (06) 2214892

高雄：綠歌造景 (07) 3840244

超透光、

耐候、

耐衝擊

● 本設施園藝從設計到完工均採一貫作業方式處理。
● 對大量採購使用此設施之農友們將予優待，歡迎洽詢。

代理



三菱瓦斯化學株式會社
三和農藝設施株式會社

元鈞有限公司

地址：台北市昆陽街171巷3弄8號1F
電話：(02) 7850550-3 FAX: 7850554

服務專線：(02) 7859588
郵政劃撥帳號：1326176-2