

唐菖蒲	萎凋病	初由最外側葉片之葉尖開始黃化以後逐漸向下延伸，同時向內側蔓延，最後整株黃化萎凋，進而引起球莖腐敗。球莖罹病時產暗紅色至紅褐色之病斑，病斑部可成同心圓狀突起，嚴重時球莖腐敗。	1.球莖種植前以25%撲克拉乳劑2,000倍浸漬3~20小時。 2.選用健康球莖。	浸漬時間不可超過24小時。	鄭安秀
	灰黴病	初期葉片產生白色之褪色小斑點，以後轉變成紅色，病斑部稍凹陷，中期病斑逐漸擴大顏色加深，後期轉為褐色，稍呈方形或長方形嚴重時病斑互相癒合，造成葉片乾枯，濕度高時病斑上易發現灰色黴狀物。花朵罹病初期產生白色小斑點，嚴重時，整朵花呈水浸狀腐爛。	使用下列藥劑於發病初期開始防治施藥一次，連續3~5次。 1.50%撲滅寧可濕性粉劑1,500倍。 2.75%快得保淨可濕性粉劑500倍。 3.50%免克寧可濕性粉劑1,500倍。		
菊花	白銹病	被害葉初呈白色小斑，繼之上表皮稍凹陷，下表皮突出，不久突出部表皮破裂，出現白色後轉極淡褐色之冬孢子堆，不久冬孢子堆再轉淡褐色，嚴重時葉片呈高低不平，但不危害莖、花。	發病初期施用75%嘉保信可濕性粉劑1,000倍，每10天施藥一次，共三至四次。	為避免發生藥害，勿提高使用濃度。	
蝴蝶蘭	灰黴病	於花朵上初期產生針尖大小之水浸狀病斑，以後稍擴大並轉成黑褐色圓形病斑，同一花瓣可同時產生數十個病斑，嚴重時花朵提前凋謝，其上並覆蓋一層灰褐色粉末狀物，花苞被危害時，則無法開放而提前脫落。	發病初期施用70%甲基多保淨可濕性粉劑2,500倍防治，每隔10天施用一次，連續三次。		

肥效長久 後勁十足



原裝進口 歷史悠久

**土壤改良** 最純正  
最佳有機質肥料

**蓖麻粕**

含有成分：

氮 6%  
鉀 1%  
磷 2%  
有機物 91%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、  
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、  
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、  
甘蔗、婆蘿、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司  
(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社  
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司  
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行  
(036) 663659 張金海 (089) 310417 陳啓明