

敏豆	銹病	為害莢、莖及葉片，被灰白斑點膨大後突部初表面露出赤褐色堆。	33%「鋅錳乃浦」水懸劑稀釋400倍於發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共4次。 30%「三得寧」乳劑稀釋1,000倍於發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次。	配藥時加展着劑「加效寶」(出來通CS-7)2,000倍。採收前12天停止施藥。採收前4天停止施藥。	曾慶德
豌豆	立枯病	本病主要發生於幼苗，成株在高溫多濕下亦可被長害。主要發生在高溫且土壤濕度時，發生高時，莖和土壤交界處變褐色，患部縮。	50%「脫克松」可濕性粉劑每公斤種子拌0.5公克藥劑，拌藥後播種種植。		
	白粉病	可為害葉片、莖、花及莢初呈灰白色小斑，以後病斑擴大成片狀，嚴重時滿佈全葉。病斑部佈滿孢子而呈黃灰或灰黑色，葉片因而黃化，影響發育。	10.5%「平克座」乳劑稀釋4,000倍，於發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3~4次。	採收前6天停止施藥。	
甜椒	疫病	幼苗，成株之根部、莖部、地上部之莖、葉部皆易受害。被水浸狀，後轉褐色。下或灌溉多濕時易發生。	5%「滅達樂」粒劑每平方公尺每次施用0.75公克於播種前施藥一次，每隔21天施藥一次，共3次。 35%「依得利」可濕性粉劑稀釋2,000倍，於播種當日及10或15天後灌藥一次，若發病時，每10天灌藥一次。	每次撒藥後，每平方公尺灌水3公升。 1.以澆水器均勻的淋灌於苗床土壤。 2.濃度提高時會發生藥害。 3.本病週年皆會發生尤其高溫多濕時，最容易發病。	

來自紐西蘭大海的……

## 紐西蘭 海底雞精

Sea-Nutrigen  
**Nuiland**<sup>®</sup>

適合 各種果樹(梨、葡萄、檳榔、蓮霧)  
瓜果、蔬菜、園藝花卉及牧草

附設技術指導中心  
歡迎農友來函索取有機肥料技術資料



ALASKABEAR  
北極熊長效肥料及粉肥

總代理：**嘉盟企業股份有限公司**

地址：台中縣大里鄉大元村國中路254-1號

TEL:(04)2624711(代表號)

FAX:(04)2624729