

洋香瓜	蔓枯病	可發生於蔓、葉及果實，發生於蔓時開始呈現水浸狀，而後裂開流出暗紅色脂，最後患部上着生黑色小點，導致蔓枯或全株死亡。	1.以隧道式設施栽培可減輕本病危害，但植穴應往內移些，以免雨水沖刷，加重其發病。 2.發病初期施用60%得滅寧可濕性粉劑2,000倍或21.2%依滅列乳劑2,000倍。 3.為免基部受害，也可將80%鋅錳乃浦可濕性粉劑調成糊狀，或將得滅寧稀釋100倍後加入滑石粉使成糊狀，塗抹於植株基部。	得滅寧及依滅列都可兼防治白粉病。	黃穗昌
	白粉病	葉片先出現退色斑，而後上面着生白色粉狀物，嚴重時葉片乾枯，植株生長受阻。	一.保持瓜園空氣流動，可減輕白粉病發生。 二.發病初期選用50%普得松可濕性粉劑2,000倍，21.2%依滅列乳劑2,000倍或1.76%瑞莫乳劑1,000倍。	施藥時藥液應噴及葉片上，下二面。	
	葉潛蠅	幼虫潛入瓜葉表皮下，如畫圖狀，嚴重時組織變褐乾枯。	發生初期施用48.34%丁基加保扶乳劑1500倍或40%三落松乳劑5,000倍。	洋香瓜果實對農藥極為敏感，未使用過的藥劑應試用無藥害後再全面噴施。	
金針	銹病	開始發病時在葉片上出現退色小點，而後上着生銹色粉狀物，嚴重時全葉密佈銹色小點，葉片乾枯。	發病初期施用47%三得錳可濕性粉劑1,000倍或33%鋅錳乃浦水懸劑500倍，每半個月施用一次，連續4-6次。		



10月鳥害季節即將來臨……

三冠 CONWED® 防鳥網

是保護高級水果、作物及水產養殖
防治鳥害最簡單、有效的方法

強韌、堅固、無毒、價廉、張掛容易

三冠牌其他系列產品：

- 防風網、遮光網、鋁箔遮光隔熱網、木瓜專用防蟲網、雜草抑制蓆、超軟優力帶、清潔蔬菜用網、簡易溫室零配件。



煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
 TEL: (047) 773878 (總機) FAX: (047) 789778