生素，應有相當程度的治療效果。

(10)收成

青甘鰺長至上市體長即可用手操網撈起出售。撈起時立即殺死放血，放在冰水中，保持新鮮度，最後加冰塊裝盒運到市場出售。

待解決的問題

在日本的中部及南部，普遍都使用浮箱網養殖青甘鰺，此種養殖方式已有15年之久，如今已出現養殖場污染及疾病侵襲的情形。

1.養殖的污染

生產一公斤的青甘鰺，平均大約需要8公斤的飼料，需視環境條件、飼料種類及魚的健康等情形而調整。養殖漁民爲使魚快速成長，通常會過度投餵，所以魚糞便及殘餌就多，累積在養殖場底部，隨著養殖規模的擴張，有機質的累積量也愈大，造成養殖場海水的優養化及底質腐敗。使溶氧降低，有毒物質產生，影響其成長。

另外，在飼料中添加的油脂會浮在海水表面，降低水的透明度及氧氣的滲入。因此，富營養化使養殖場透明度下降、生產力減少，以及紅潮引起死亡和疾病感染在在都是此業的困難，但只要放養密度適當與有效的投餵管理，甚至於更換養殖地點，仍會有穩定性的高生產量。

2.疾病的感染

養殖場愈老化，疾病的感染率愈高，如果用藥不當，包括過量，過久或施錯藥等情形，將會造成抗藥性細菌發生，而引起大量死亡。因此藥物使用宜非常小心，最好能就教於水產研究單位。

過度投餵、放養密度高、空間太小及缺乏運動都容易引起疾病，所以養殖業者應該注意維持魚的健康，而不應只注重生長率及高生產力。 ■