

害虫，若虫自孵化後約10~14天在體外形成橢圓形殼，包住虫體形成假蛹，及至化蛹脫殼變成虫的此段時間內，幼虫皆吸附在葉背吸食汁液，同時在葉表面產生淺黃色碎斑，當虫數多時造成葉片黃化萎凋。由於此虫會排出蜜露吸引螞蟻取食，具誘發黴菌發芽為害植株生長。目前在防治上建議採用合成除虫菊類葯劑防治，且需噴洒於葉背才有效，連續施葯2至3次，間隔5至7天。如果發現成虫約每株4至6隻時，可使用防治葯劑並配合使用長效性劑埋設，以增強防治效果。

6. 薊馬(Thrips)：薊馬大多在新芽生出及幼葉形成尚未展開之前，為害葉芽部位。此虫多由外地引入或藉由颶風吹襲侵入為害。被害嫩芽輕者葉緣黃枯或有褐斑壞疽，成葉伸展不全也有葉片捲縮凹陷，影響觀賞價值。防治上同粉蝨防治即可。

7. 蚜虫(Poinsettia aphid)：通常在秋季或冬初氣候正值蚜虫尋找新寄主之際，栽培者大多可發現有翅型蚜虫藉颶風吹送至新寄主，由於其寄主相當多且雜，在聖誕紅葉片上也可發現少數為害之有翅型成虫，唯其為害狀況尚不明顯且虫口數少，不足防治。防治方法可參考使用85%加保扶可濕性粉劑(Furadan)稀釋2,000~2,500倍。

8. 蟎類(Leaf mites)：蟎類大小在0.1~0.2 mm，如同針尖頭一般。通常在葉片背面吸食為害，在葉片表面會造成白色小碎斑。此虫性喜高溫乾燥且具抗葯性，一般在施葯防治聖誕紅其他害虫後，仍可生存。所以在防治上應選用殺蟎劑，同時可配合混用夏油乳劑一同防治較有效。參考使用葯劑以18.5%大克蟎可濕性粉劑(Dicofol)稀釋2,000~2,500倍或50%錫蟎丹可濕性粉劑(Plictran)輪流施用。



信用的標誌 品質的保證

適用作物：各種果樹、蔬菜、豆類、花卉。

西德S.K.W

優肥®

(氮氮化鈣)

總含氮量：18%

肥料登記證：北市建三肥字第571號

優肥：
徵桃園、苗栗經銷商

葉面施肥

含微量元素之複合肥料

六合肥系列

六合肥1號：19-19-19
六合肥2號：9-45-9
六合肥3號：11-8-30
六合肥4號：14-19-19

肥料登記證：北市農推字第00501/00502/00503/00504號

六合肥：
徵各縣市經銷商

六和化工股份有限公司

台北：02-5954321：吳經理
台中：04-3593821：陳小姐
高雄：07-8717881：陳先生

訂國語日報

送國語兒童畫報

看兩份報紙

看國語日報
家長才放心

花一份報費

- 國語日報是一份「小型的大報」，內容純正高尚，消息迅速正確。
- 國語日報，每天發行報紙四張，共十六版。內容有新聞版、專欄、報導兒童青少年新聞。副刊版有兒童、少年、家庭、體育、科學常識、好老師介紹、謎語、學校介紹、少年習作、連環漫畫、圖文並茂，一份報，全家看。
- 訂報：(〇二)三四一二四四八

每逢周三、周六附贈字大內容有趣、印刷精美的「國語兒童畫報」二張八版。花一份報費，看兩份報紙，兩份報紙每月共收二四〇元。

