

不錯的存活率。而幼鮑在此溫度範圍亦有穩定的生理狀態。其被面子可生存在鹽度為24.1~36.3%的範圍，而以鹽度為30.8~36.3%為最佳。至於再低的鹽度，對鮑魚而言是致命性的。因此在不能控制鹽度的魚池中，頗不適合。今年在花蓮因雨量太大，致九孔池的鹽度降低，引發大量死亡的情形，即為明顯的例子。

養殖鮑魚還有一點要特別注意，就是要瞭解鮑魚體重與溫度及耗氧三者之間的關係，做為管理的依據。而養殖池中池水的換水率亦要保持在每小時50%或更高，同時也要把海水加以過濾來防止動物性浮游生物及懸浮物的污染。並在池內加裝通氣管或噴氣管來增加溶氧。在夜間，更要注意水中的氧含量以防鮑魚泛池死亡。尤其避免因斷電而斷氣的意外事件。

在水溫較高的月份，水中的鮑魚殘餌或排泄物很容易引起水質的敗壞。因此，適時小心定期清理池底及過濾池水是必要的。至於誘導鮑魚排卵、洗卵及幼鮑養殖，都可用特製的40um的網目加以過濾。此因經過過濾的海水，其中的原生物(protozoa sp.)，及一些其他的

附着生物都可被隔離。


### 5. 敵害

鮑魚之主要敵害為章魚、蟹類及海星。這些生物若發現時，宜儘速消除。

### 6. 種苗的運輸與銷售

鮑魚種苗的運輸是採用一種保麗龍盒子，裏面為含有海水濕潤的鮑魚盛器。盒子應保存在10~15°C，這樣，鮑魚苗可耐上24小時的運送。

目前，種苗是以體長為30~50公釐作為銷售對象。這些種苗，大部份被放流到岸礁地帶，有些則作為完全養殖之用。




### 各有所獲

唐先生71歲生日，寫信給人壽保險公司：「時光易逝，我又多活了一年。」

人壽保險公司回信：「托你的福，我們也賺了你一年的保費。」(阿吉)

來自紐西蘭大海的.....

## 紐西蘭海底雞精



Sea-Nutrigen  
**Nuland**

適合 各種果樹(梨、葡萄、檳榔、蓮霧)  
瓜果、蔬菜、園藝花卉及牧草

附設技術指導中心  
歡迎農友來函索取有機肥料技術資料



ALASKABEAR  
北極熊長效粒肥及粉肥

總代理：**嘉盟企業股份有限公司**

地址：台中縣大里鄉大元村國中路25-4-1號

TEL:(04)2624711(代表號)

FAX:(04)2624729