

粒或3粒，待株高15—20公分時間苗，每穴留1株，若有缺株時，前後穴可多留1株，以免影響株數，間苗不可過早或過遲。

6. 中耕除草：

中耕應在第1次及第2次追肥後舉行，中耕勿過深，以免切斷根部。玉米生育期如遇降雨，雨後即應中耕，增加土壤水分的滲透，並促進根部發育。

7. 灌 溉：

不同玉米生育期對水分的需求量亦異，生育初期應保持適當的水分，開花期所需水分最多，若此時期缺水對產量影響最大。

一般在播種後30天，雄花抽穗期及吐絲期應各灌溉一次，同時為使果穗免於過速老化影響品質，在授粉後土壤應保持濕潤。

8. 排 水：

玉米生育期間如受到浸水，會使莖葉變黃，發育受阻，甚至枯萎，嚴重影響生育及產量。因此玉米生育期間如遇雨季，應做好排水工作，嚴防田間積水。

施肥量與方法

台南18號屬早熟品種，生育期短，生長快速，宜充分施肥。

1. 施肥量：每公頃硫銨800公斤，過磷酸鈣300公斤，氯化鉀120公斤。

2. 施肥法：

(1) 基肥：硫銨半量，過磷酸鈣全量及氯化鉀半量混合一起做為基肥，於播種前施於播種溝。

(2) 追肥：硫銨半量及氯化鉀半量混合一起做為追肥。第一次追肥於播種後25天施在植株5公分處，即時培土覆蓋，第二次追肥約

超甜玉米台南18號施肥量與方法

肥料種類及施肥期	基 肥 (公斤/公頃)	第1次追肥 (公斤/公頃)	第2次追肥 (公斤/公頃)
硫 銨	400	200	200
過 磷 鈣	300	—	—
氯 化 鉀	60	30	30
複合肥料39號	500	200(硫銨)	200(硫銨)
施 肥 期	播種前	播種後25天	播種後45天

肥效長久 後勁十足



原裝進口 歷史悠久

土壤改良
最佳有機質肥料

最純正

蓖麻粕

含有成分：
氮 6%
鉀 1%
磷 2%
有機物 91%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆蘿、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司
(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青菓社
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行
(036) 663659 張金海 (089) 310417 陳啓明