

菊花	白銹病	被害葉初呈白色小斑，上表皮稍凹陷，下表皮突出，不久，突出部的表皮破裂，出現白色後轉極淡褐色之冬孢子堆，有時病斑可互相癒合成一大斑，每一葉片上可多達數百個，嚴重時葉片呈高低不平，但不為害莖和花。	應栽培抗病品種，冬王為強抗性品種，黃東亞為中抗性，香港紅則為易感性品種。可用75%嘉保信可濕性粉劑4000倍和20%乳劑1000倍，於發病初期開始，每隔10天噴藥一次。但本藥劑單獨使用時，易產生抗藥性菌株。	鄭安秀
唐菖蒲	萎凋病	初由最外側葉片之葉尖開始黃化以後逐漸向下延伸，同時向內側蔓延，最後整株黃化萎凋，進而引起球莖腐敗。球莖罹病時產暗紅色至紅褐色之病斑，病斑部可成同心圓狀突起，嚴重時球莖腐敗。	1.球莖種植前以25%撲克拉乳劑2000倍浸漬3~20小時。 2.選用健康球莖。	浸漬時間不可超過24小時
	灰黴病	初期葉片產生白色之褪色小斑點，以後轉變成紅色，病斑部稍凹陷，中期病斑逐漸擴大顏色加深，後期轉為褐色，稍呈方形或長方形嚴重時病斑互相癒合，造成葉片乾枯，濕度高時病斑上易發現灰色黴狀物。花朵罹病初期產生白色小斑點，嚴重時，整朵花呈水浸狀腐爛。	使用下列藥劑於發病初期開始防治施藥一次，連續3~5次 1.50%撲滅寧可濕性粉劑1500倍 2.75%快得保淨可濕性粉劑500倍 3.50%免克寧可濕性粉劑1500倍	
	赤斑病	主要為害葉片。受害的葉片初產生白色針狀褪色斑，以後病斑逐漸擴大為橢圓形，呈紅褐色。嚴重時多數病斑癒合造成葉片乾枯，球莖被害時亦產生紅褐色凹陷斑點。	應採用適當的肥培管理，以增強植株的抵抗力。注重田間衛生，以減少病源的傳播。藥劑防治，可選用50%撲滅寧可濕性粉劑1500倍，於發病初期開始噴藥以後每隔7天噴藥一次，連續3~4次，配藥時加展着劑如CS-7，3000倍。	



豐年叢書 技術服務

本社出版之豐年叢書，多數為應用技術，購閱後如有實際問題，歡迎來信詢問。來信請寄：台北市29號信箱讀者服務部。書籍如發現缺頁或裝釘不完整者，請寄回調換。需要書籍目錄者，來信即寄。

豐年社

台北市溫州街14號 (02)3628148
郵購劃撥0005930-0豐年社。