

開始為害主根之表皮，老熟後在其中化蛹，因此，植株受害嚴重時，根莖枯乾，地上部萎凋枯死。

防治法：(1)整地時每公頃均勻撒布5%「二硫松」粒劑20公斤或10%「福瑞松」粒劑10公斤，充分攪拌混合。(2)種子萌芽至4片葉時，每星期噴灑40.64%「加保扶」水懸粉400倍液1次，連續噴約3次。

10. 蚊蟲

蚊蟲為雜食性昆蟲，寄主達270餘種，為世界性昆蟲，多數群棲嫩芽及幼葉上為害，吸取養液，致使生育遲鈍萎縮，被害葉部及心部捲縮。

防治法：為害時可用50%「培丹」水溶性粉劑1,000倍、90%「納乃得」可濕性粉劑3,000倍、50%「比加普」可濕性粉劑2,000倍、40.64%「加保扶」水懸劑1,200倍、75%「加保扶」可

濕粉劑1,000倍液等藥劑防治。

11. 豆莢螟


本虫幼虫主要為害開花後至未成熟階段之豆莢，受害停止生育且變成畸形、幼莢脫落。

防治法：開花時每隔7~10天噴施50%「加保利」可濕性粉劑1,000倍液或85%「加保利」可濕性粉劑1,700倍液，連續噴2~3次。

12. 紅蜘蛛

主要為害生育中之植株葉部，成虫及幼虫均棲息葉背危害，老葉較多、吸食汁液，影響植株生育，被害處葉綠素消失，出現灰白色微小斑點，密度高時，可使葉片變黃脫落捲曲乾枯而產量降低，在高溫乾燥季節發生較嚴重。

防治法：發生時可用18.5%「大克蟎」可濕性粉劑500倍或35%「芬佈克蟎」可濕性粉劑500倍液防治，並於施藥後7~10天再施藥一次。




最新式懸吊設計
震動減少50%
操作舒適

KURIN
三菱·克林 草刈機

※ 最大馬力52cc.

職業手專用



軟管	T170	33cc.
	T200	41cc.
	T240	52cc.
硬管	T170	33cc.
	T200	41cc.

零件及刀片規格齊全

徵求各地區經銷商

菱祥企業有限公司

高雄市小港區沿海一路273號

TEL: (07) 8022066~8

FAX: (07) 8032198