




圖9 種貝直接垂吊方式

珍珠的品質受到的肥沃度、水溫、海流和其他海域狀況等的影響。一般說來，在水流強的地方、珍珠層形成較快，故品質較差；而在水深超過5公尺以上的地方，形成珍珠層較慢，但是品質好，且帶桃色光澤。因此為收成高品質的珍珠，在垂掛的地點和深度的選擇上必須特別的注意。

放養密度不可過分擁擠

飼養珍珠貝的放養密度也是一個重要因子，過分擁擠的環境會造成許多不利的影胞。如：降低珍珠的品質、減少珍珠層、傳播疾病或寄生蟲等。近幾年由一種多毛類Polydora ciliata所引起的寄生蟲病，已經引起珍珠貝養殖的高死亡率。

吊養時期，有些有害的微生物、碎石、淤泥會附在貝殼的表面，這些沉積物針對珍珠品質的降低、珍珠層的減少或死亡率都有關連。




圖10 珍珠的形成


因此在水溫超過 15°C 時，每年至少應將貝殼清洗3~5次，清洗時，將珍珠貝拉到水面上，用小刀將那些物質刮除。當冬天水溫降到 10°C 以下時，應將竹筏拖到比較溫暖的海域中越冬。

植株後的珍珠貝在海裏養成，大約要2--3年方可收成。日人為宣傳其養殖珍珠的產品，常在海洋公園中表演採珠的情形，功用頗大。

珍珠貝的收成和加工

採收時，將珍珠貝帶回，切斷其閉殼肌後打開殼，利用手工或機械將珍珠取出。利用機械取珠是將貝體內的柔軟組織攪碎後並清除掉，即可收成珍珠。

珍珠取下後，用清水洗淨，精鹽磨光，再依照珍珠大小、光澤、形狀、顏色和其他特色，加以分類後送去拍賣。



性感女明星的自白：
「誰說我什麼都沒穿？我穿幫啊！」

(周錦霞)