

# 台中地區

資料提供 / 台中區農業改良場

台中區農業改良場區內主要作物春季病蟲害防治備忘錄

項目 (作物名稱)	有可能發生之病蟲害	症 狀	防 治 對 策	備 考	執筆
水稻	二化螟虫	幼株期水稻有折葉、倒葉、葉鞘黃變現象，係螟虫侵入為害特徵。4月中、下旬會引起枯心。	於水稻幼株期發現有前述症狀，且其被害率達10~15%時，即應施藥加以防治。任選植保手冊防治藥劑一種，如撲滅松、一品松、芬殺松等。	若幼株期被害率少於10%則勿施藥以免浪費。	劉達修
甜椒 非洲菊	茶細蟎	為害嫩葉及心芽，致生育停滯，葉片變色脫落等。	施用80%可濕性硫黃4,000倍等，注意應噴及心芽及嫩葉。	設施栽培者發生較嚴重應注意。	
非洲菊等 花卉	非洲菊 斑潛蠅	幼虫潛食葉成無數白色潛道，影響品質及產量。	1.利用黃色粘板、盤，誘殺成虫。 2.施用75%沱嘉讚5,000倍、50%培丹1,000倍、50%硫賜安1,000倍、40%三落松1,000倍。		
梨	梨瘤蚜	為害果實	3月下旬—4月上旬套大袋前施藥1~2次。藥劑暫選用60%大利松1200倍，40%雙滅必蝨800倍，48.34%丁基加保扶1,200倍，20%滅必蝨800，50%滅賜克1,000倍，40.8%陶斯松800倍，注意將藥液噴至接穗處，果柄，果實等。		劉達修 劉添丁

## 農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



- 適用於：  
莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類
- 用途：  
防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收
- 大量減少農藥使用次數

- 主要產品：  
花網 / 瓜網 / 芹菜網 / 蘭草網 / 豌豆網 / 洋香瓜網 / 甜椒網 / 蕃茄網 / 紅辣椒網 / 葱網 / 大蒜網 / 蘆筍網 / 茄網 / 萬年青網 等各種農業用網
- 其他產品：漁網 / 運動網 / 安全護網

### 欣隆製網股份有限公司

工廠：彰化社寮厝路174-1號

電話：(047)524625、613567

傳真機：047-611750

番石榴	粉介殼虫	爲害葉片，果臍，枝條，並能誘發煤污病，影響品質。	1.選25%谷速松800倍，50%普硫松2,000倍，50%歐滅松1,000倍或40%滅松800倍。 2.5、6月行大剪枝可减少其密度。		劉達修
十字花科蔬菜	菜心螟	爲害葉部	注重幼株期心部的保護，可使用蘇力菌1,000倍加50%二氯松劑1,000倍，或加25.3%美文松乳劑500倍防治。		方敏男 劉達修
	斜紋夜盜	爲害葉部	摘除卵塊，設置性費洛蒙誘虫盒誘殺雄虫，虫口密度高時以蘇力菌1,000倍加2.8%賽洛寧乳劑2,000倍，或加2.8%畢芬寧乳劑2,000倍防治。		
	小菜蛾	成虫產卵於葉背，粒粒分散，孵化後之幼虫爲害葉片，成熟後結薄繭化蛹於葉背。	生育初期使用50%培丹水溶性粉劑1,000倍加2.8%第滅寧乳劑1,000倍，每7天施藥一次，生育後期施用25.3%美文松乳劑500倍加蘇力菌1,000倍，每5-7天施藥一次，採收前之3天停止用藥。		方敏男
	桃蚜及偽菜蚜	若虫及無翅成虫群聚於葉背或心葉吸食汁液、分泌蜜露誘發煤病，嚴重時葉片枯萎致植株死亡。	生育初期施用50%培丹水溶性粉劑1,000倍或2.8%第滅寧乳劑1,000倍或50%比加普可濕性粉劑2,000倍，每7天施藥一次，生育後期施用50%二氯松乳劑1,000倍或50%馬拉松乳劑1,000倍防治。	如同時發生小菜蛾，則針對小菜蛾防治即可。	
梨	赤星病	葉片出現淡紅色小點，擴大後成紅褐色，表面稍凸出，產生精子腔，不久其背面突出數公厘毛絨狀淡色銹子腔，頗爲顯目，至後期病斑處轉黑，嚴重時引起落葉。	76%富爾邦W.P 500倍，自梨樹新葉萌發後10天，每10天施藥一次，連續四次；12%芬瑞莫W.P 5,000倍，或5%三芬W.P 10,000倍，25%他多農W.P 5,000倍於發病初期開始噴藥，每隔10-14天噴藥一次，連續4次。		黃秀華
	黑星病	初期葉脈上呈現黑色絨毛狀物，爲本病病菌分生孢子堆。除葉片外可危害葉柄及幼果，被害果後期被害處呈瘡痂狀而失去商品價值。	參考植保手冊		
	黑斑病	爲害葉、新梢及果實，葉片上由小黑點擴大呈輪紋斑，且黃暈，葉緣呈不規則形，枝條由黑色圓斑擴大呈黑褐色橢圓形，與健全部相界處裂開，幼枝受害則呈粗糙。果實由黑色圓斑擴大，幼果由此被害時不致裂開。	50%依普同W.P 1,000倍，發病初期每隔10天施藥一次，共5-6次。		