



|           |     |                                                     |                                                                                |     |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 葱         | 葱潛蠅 | 卵產於葉部組織內，幼虫孵化後在葉肉潛食危害，受害葉片呈長條白色食痕，致被害部枯萎或腐爛。        | ①以50%益滅松w.p. 稀釋1000倍於害虫發生後，每隔7天施藥一次採收前7天停止施藥。<br>②利用黃色黏板誘殺成虫。                  | 李聯興 |
| 西瓜<br>洋香瓜 | 蔓枯病 | 枯株感染後初期於葉片、莖或果梗形成黑褐色病斑繼而於莖上及果梗的表皮層形成瘡痂病斑，被害組織終呈暗流膠。 | ①使用18%貝芬寧水懸劑450倍，得滅寧可溫性粉劑60%，2000倍及20%依滅列 EC等藥劑於發病初期開始施藥每隔7—10天施藥一次。採收前3天停止施藥。 |     |

## 櫥·窗·廣·告

小小的投資·豐富的收穫

每單位(5×5公分)費用1,500元

- 刊登前請利用郵政劃撥0005930-0號，廣告稿請寫在劃撥單通訊欄內。
- 來稿及廣告費請於出版日15日前一併寄到。

## 幻燈片教材 特價供應

### 施肥改善指導

- 生育障礙與施肥
- 土壤溶液之世界
- 施肥改善之基礎
- 土壤診斷與施肥設計
- 施肥改善之實際

立體片夾，附詳細中文說明書，5月底以前訂購，贈送看片器，型錄備索。

Green

友玉企業股份有限公司  
新營郵政120 電話(06)6322511  
郵政劃撥03228868友玉公司帳戶