

其上並附幼虫之毒毛，誤觸時常引起皮膚紅腫，奇癢難受，成虫有趨光性，以五～六月為發生盛期，一年可發生八～九世代。

柑毒蛾之雌蛾前翅細長，而雄蛾體色淡褐，腹背有直立之黑色毛塊，交尾後將卵200～300粒產於一處，通常產於隱密的葉間或枝條上，卵球形，其周圍白色，卵之上半淡黃而下半白色，甫孵化時有群棲性。幼虫頭部紅色，胴部有灰白色斑點，頭方兩側具有黑色角狀毛束，第四～七節背方有淡黃色毛塊直立，第四、五節側方具不同毛束，前者白色而後者為黑褐或灰色，腹部背方之忌避腺呈深紅色且突出，尾端背方具暗褐色毛束一，體長約35mm，幼虫之食性極雜，老齡幼虫食量大，主要啃食新母莖之幼嫩枝葉或老株之表皮或葉部或嫩筍，被害植株及早枯萎，而幼筍被啃則變形且失去商品價值，老熟幼虫於葉間作繭化蛹，其上並附有幼虫

之毒毛，誤觸時，常引起皮膚紅腫難受，成虫有趨光性，每年可發生六世代。

(五)赤邊燈蛾：(Arctiid, Cotton Caterpillar; *Amsacta Lactinea* Cramer)

農民常稱赤邊燈蛾為大毛毛虫，幼虫食性亦雜。成虫之頭、胸及翅呈白色，頭頂、頸部、前胸背之後緣、前翅之前緣及其基部呈紅色，前胸腹側有赤紋，腿節之一部份呈赤色，紅白分明極鮮美，交尾後雌蛾將卵40～50粒產於一處，並附有淺褐色尾毛少許，甫孵化之幼虫呈桔黃或黃褐，並被有稀疏長毛，老熟幼虫被黑褐或棕色長毛，各節有多個疣狀突起，行動敏捷，幼虫以植株之幼嫩部為食，其幼虫期長且食量大，被害枝條常被啃斷，或啃食幼株或葉部而影響植株生長。老熟幼虫於土粒或殘株間作繭化蛹，繭上並附有幼虫之體毛，蛹期可達兩個月以上，成虫有趨光性，年發生三世代。

○ 海外技術合作委員會 ○

誠徵

駐外農技人員

- ▲項目：農藝、園藝、花卉、果樹、竹工藝、水利、漁撈、水產養殖、畜牧、獸醫等技術人員。
- ▲男、役畢、大專以上50歲以下(團長級除外)，諳英文或西文，大學畢業，有二年以上(專科三年)相關工作經驗者，如具公職身份可代洽辦借調手續。
- ▲以新台幣支給月薪58,400～121,800元並視學經歷、外語能力等條件優予核薪，另按地區別加發地域加給美金260～1060元。
- ▲每一任期為二年，可連續多次續派，任滿一年未接眷者，由本會負擔機票返國休假四週(照支薪)，駐外期間享有綜合保險，福利佳。
- ▲意者請寄回郵信封至台北市郵政7-0762號信箱海外技術合作委員會秘書處第一組索取資料或電洽(02) 7375642陳先生