

龍眼果實褐銹斑的防治法

問 1. 我所栽培之龍眼於三年前開始發現春季花芽長出時有畸型之病變現象發生，起初只有一、二棵果樹的幾枝花穗有這種現象，到今年已發現有十幾棵龍眼有此種現象，較嚴重者，一棵樹上有幾十把花穗畸型。今特寄上病變之花芽，請教專家是何病因？如何防治？

2. 龍眼果實成長期於梅雨季節，果皮會有褐色之銹斑，到果實成熟後，果皮顏色呈暗黑色，農藥行之藥商介紹用（億力）、（萬力）殺菌劑防治，情況有好一點，但成本太高，請問此是何種病因，有無較經濟之防治方法？

3. 聽說荔枝之品種有三十六種之多，請問最好吃最上品之前三種是何品種？在本省現有栽培較早熟之品種有那幾

個較優的品種，而最晚熟之品種又有那幾個品種？（台中縣湯碧修）

答 1. 龍眼之畸型花穗無法鑑定是何原因，請詳述有否噴用何種生長素，或其他藥劑，並注意昆蟲為害引起之可能性。

2. 龍眼果實褐色銹斑可比照荔枝露疫病防治，可噴用55%之腈硫醃銅可濕性粉劑、72%鋅錳克絕可濕性粉劑、33.5%快得寧水懸劑、33%鋅錳乃浦水懸劑（任選一種防治）。

3. 荔枝品種甚多，目前品質以早生之玉荷包，晚生之糯米滋最佳，目前栽培之早熟種有三月紅、玉荷包，晚熟種有糯米滋、桂味等。

（鳳山園試分所鄧永興）



MELOBAC®

メロバック 水性微生物

特級 農神-M

（磷·鉀·鎂吸收促進劑）

審定商標第00361933號號

歡迎研究班來函索取目錄及微生物技術指導手冊

神農行

農友信箱台中郵政2374號 電話：(04)3898288

台中市西區昇平街22巷3號

新型第三代微生物

微生物技術指導員
／簡富裕

農神活菌對葡萄肥培的管理

春天開始，農友忙於耕作，此時葡萄剪定後，已發出新梢，根部已開始長出根毛，準備吸收肥料以供葡萄開花、著果、生長之用。此時應以農神500倍灌土，以分解根酸，擴展根群，平衡EC值，幼果期可配合腐植酸1000倍或海藻精1000倍灌注土壤效果更好。使用農神活菌，可以觀察葡萄新梢，可以很快轉為成熟枝條，提早開花結果。感謝溪湖、二林、東勢、白茅台、信義的農友使用。

註：農神可配合其他農藥使用，但大富丹及快得寧應避免。