

→ 施殺草劑，藉以抑制雜草生長。殺草劑可以34%施得圃乳劑，稀釋240倍，每公頃藥量2.5公升。

**立支架：**蔓性菜豆在播種後25天左右，花芽開始分化，為避免根部受損波及開花結果，在花芽分化前應先將支架豎立好，支架在畦上交叉或溝上交叉都可，但以溝上交叉，採摘豆莢較方便。

## 施肥

菜豆因根瘤菌寄生發育較慢，所以生育初期應多施速效性氮肥，促進初期生育。施肥量及方法視土壤肥力及作物生育情形而定，以下僅供參考。

種類 \ 方法	總量(公斤/公頃)	基肥(%)	第1次追肥(%)	第2次追肥(%)	第3次追肥(%)
堆肥	1200				
氮素(N)	90~120	30	30	20	20
磷酐(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	60~90	100			
氯化鉀(K <sub>2</sub> O)	90~120	50		25	25

註：硫酸銨含氮素21%，尿素含氮素46%。過磷酸鈣含磷酐18%。氯化鉀60%，硫酸鉀含氧

豎立支架栽培



化鉀50%。

第1次追肥在矮性品種播種後15天，蔓性品種在立支架前，第2次追肥在第1次追肥後15天。矮性品種追肥2次即可，蔓性品種因結莢期較長，可視生育結莢情形追第4次肥，用量比照第一次。



## 灌溉與排水

菜豆種子發芽時吸水量大，因此，通常播種前先讓土壤保持濕潤，亦有部份整地田，因

# 三菱園藝浪板 超透光、耐候、耐衝擊



收頭板“S”型  
宜用於中脊



現實尺寸：  
寬度 / 3.3台尺  
長度 / 6台尺、7台尺、8台尺

## 元鈞有限公司

地址：台北市昆陽街171巷3弄8號1F  
電話：(02)7886580-1 FAX：7886850  
服務專線：(02)7859588

代理 三和農藝設施株式會社

