



→ 斑，凹陷，周緣赤色，最後變黑色，如病勢繼續，則植株全株萎縮，葉片裂開穿孔，莖、莢病斑上分泌鮭肉色粘液。


防治方法：(1)種子採自健康豆莢，並以蓋普丹拌種(2)栽培抗病性品種(3)幼苗發生時，收集燒毀，避免連作(4)成株病發時用大生45稀釋400倍。

根潛蠅：豆苗出土後約一週，雌成虫開始在豆葉上，用尾部將之刺破而舔其汁液，並產卵於嫩莖上，幼虫孵化後即潛入莖表皮，再直下地下部，開始為害主根表皮，老熟後在其內化蛹。任選下列一藥劑防治。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%二硫松粒劑 (Disulfoton)	40公斤		種植前施藥於溝畦中，僅施藥一次。	為求施藥均勻，可將藥劑拌於酌量之土或砂中施用。
5%二硫松粒劑 (Disulfoton)	20公斤		種植前施藥於溝畦中，僅施藥一次。	
10%福福松劑 (Phorate)	10公斤		種植前施藥於溝畦中，僅施藥一次。	
3%加保扶粒劑 (Carbofuran)	40公斤		種植前施藥於溝畦中，僅施藥一次。	
50%歐威松液劑 (Omethoate)	1公升	1,000	大豆萌芽出土後開始施藥，每隔7天施藥一次，連續四次。	藥劑於肥料混合均勻，施於播種溝，覆土1至3公分後播種，以防除莖潛蠅。 1. 防除根潛蠅以及莖潛蠅。 2. 採數前60天，停止施藥。

流滴®透明耐候膠布

- 適合台灣亞熱高溫高濕栽培環境，經測試2~3年耐候性強韌，具防塵防霧，流滴效果，信用卓著，頗獲好評。
- 適用洋香瓜、蘭花、水耕蔬菜栽培。
- 流滴為本公司註冊商標請認明購買並請同業勿以仿冒。



捲揚式溫室

- 克服亞熱高溫高濕及連作障害，以捲揚塑膠布節省能源使通風順暢，並降溫效果。
- 代客設計、批售、施工。

玉和實業股份有限公司

台北市木柵區保儀路109巷3弄34號
電話：(02) 9385066~8
傳真機：(02) 9385018

紅泥®耐候塑膠布

- 耐候性強
久曝日曬，不易老化。
- 並經中、美、比、加、印、英、澳、韓、法等國專利。
- 適用於沼氣槽、水耕、洋香菇舍、養殖池及其他水利、建築、防水工程等。

其他農業資材

固定壓條(ビニペット)日製固定帶(ハウスバンド)、遮光網、白、青網，溫室搭建零件、捲揚槓等批售。