

夏季主要農作物病虫害防治備忘錄③

台中地區

資料提供 / 台中區農業改良場

台中區農業改良場區內主要作物夏季病虫害防治備忘錄

項目 (作物名稱)	有可能發生 之病虫害	症	狀	防	治	對	策	執筆
葡萄	晚腐病	危害果粒呈赤褐色，稍凹陷後擴及果實全部組織。表面著生淡紅色黏汁。果實軟腐。		50%滅克接 WP 6000倍 25%滅克接 EC 2500倍 16.5%滅紋 EC 200倍 於開花初期開始，每隔10天噴灑一次。				黃秀華

夏季主要農作物病虫害防治備忘錄④

台東地區

資料提供 / 台東區農業改良場

台東區農業改良場區內主要作物夏季主要病虫害防治備忘錄

項目 (作物名稱)	主要病蟲害 種類	症	狀	防	治	對	策	執筆
果樹類 番荔枝 (釋迦)	乾旱：正期 果開花不結 果	花器之雌蕊(柱頭)黏稠性降低，雄蕊(花粉)無法成熟，結果率極低。		1.乾旱期應於零晨12時至翌晨6時，全國以黑色塑膠軟管噴水，提高果園之微濕度。				謝進來
	薊馬 蚜虫	為害嫩梢及花器造成心葉捲曲並有物理疤痕。蚜虫吸食心葉及花器造成發育不良。		1.全園噴水降低密度 2.以48.34%可基加保扶1,500倍全園噴藥防治				
木瓜	赤葉蟬	為害木瓜中、老葉，形成銹色斑點，嚴重造成落葉。		1.木瓜園乾旱期需噴水提高濕度降低葉蟬發生 2.20%西脫蟬1,500倍全園噴施				
	疫病	為害葉片、果實初有流汁狀，約呈壞疽之深褐色斑塊。		1.避免連作 2.以75%甲基銻乃浦400倍全園施用				
柑桔	葉蟬 銹蟎	乾旱期較易發生為害，被害葉片呈銹色斑，果實外觀有褐色疤痕。		1.以50%芬布腸2,000倍全園噴施				
	潰瘍病	被害處早水侵狀暗綠色，後破裂呈鮮褐色木栓化且表皮粗糙堅硬。		1.81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1,000倍全園噴施(最好下午3時以後施藥，以免高溫有藥斑)				