

→ 凍加工兼用之特性，可疏植且適合機械採收，以達到降低生產成本。

2. 高雄3號：

本品種結莢緊密，兩粒種仁以上莢果數多，合乎外銷規格之綠莢果產量高，綠莢採收期莢果不會發生紫斑（黑頭），莢果發育均勻，每500公克所合格莢數約160莢，色澤翠綠，莢形呈鎌刀狀，可疏植且適合機械採收。



翠綠色的鮮毛豆，外銷日本最多。

栽培管理

1. 適合栽培地區及季節

高雄2號及高雄3號以富含有機質、排水良好之砂質壤土或砂壤土種植為宜，適合的栽培地區及季節以高屏地區春、秋作為佳，次為中部、嘉南、東部、北部地區。

2. 播種期：

高雄2號及高雄3號春作可提早播種，在1月中旬播種生育正常，夏作6月上旬為佳，秋作9月中旬至10月中旬為宜。

3. 種子用量

種子應精選純正飽滿無病虫害，以秋作留種為佳。並採用機播以節省人工，提高工作效率。種子用量每公頃約90~100公斤（行距40公分，株距10~15公分）。

4. 經濟肥料施用量

高雄2號及高雄3號生育期長，播種後80~85天始可收穫，必須注重基肥之施用，於整地前將所需氮、磷、鉀用量攪拌混合均勻後施於田中，再整地、碎土、播種，其肥料施用量，

高雄2號N:P₂O₅:K₂O 40:60:60，高雄3號N:P₂O₅:K₂O 100:60:60。

病虫害防治

1. 病害防治：

毛豆銹病發病較嚴重在生育中期以後（R₄），開花結莢時用鋅錳乃浦可濕性粉劑（80%）400倍與撲滅松或萬靈等殺虫劑混合攪拌後噴射於毛豆植株，可防治豆莢螟及銹病之為害。請參考農林廳植物保護手冊。

2. 虫害防治：

毛豆虫害以豆潛蠅(Beantly)及豆莢螟(Pod Borer)為害嚴重，豆潛蠅為害發芽之幼苗，豆莢螟為害豆莢，增加不合格莢，降低毛豆產量，豆潛蠅於毛豆發芽後3~4天用歐殺松液劑(Folimat 5%)1000倍稀釋防治，每隔7天施藥1次，連續4次，毛豆莢子實充實用撲滅松(Lannate 90% WP)2000倍稀釋噴射一次或二次防治豆莢螟之為害。請參考農林廳保護手冊。

注意事項

種植毛豆避免連作，依據田間視察之結果，毛豆田連作病害較易發生，且合格莢產量降低。



專營歐美各種植物激素及營養劑

對象：農業界同業，研究單位，大、中盤商。

產品種類	規格
勃激素(GA ₃)	2%S, 3.1%WP, 10%TaB
吲哚丁酸(IBA)	0.4%S, 0.5%DP
對氯苯氧乙酸(4-CPA)	0.15%S
糠氨基嘌呤(Kinetin)	
苯氨基嘌呤(6BA)	
奈氧乙酸(BONA)	
最高效速溶海藻精，配製液體最方便。	
日本神協海藻精。	
腐質酸鉀鹽、鈉鹽、銨鹽可溶粉劑	
上述原料及其他各種矮化劑	

聯絡電話(02)5098194

歡迎查詢：伍維貿易有限公司

台北市復興北路402巷8弄4號4F