



圖3. 裙帶菜的(A)浮架(B)浮筒養殖法

卵即發育成孢子體，同時需換水及添加營養鹽以促進孢子體的快速生長。如果生長仍是緩慢時，可將槽內的水，冷卻到20℃或將採苗器投放於海中。到10月或11月時，孢子體將長到100~1000u的大小。

3. 裙帶菜的養成

在冬季，從9月到11月間，裙帶菜開始以懸浮式的方法在海中養殖，此時的水溫以不超過20℃為適合，以低於15℃的養殖最佳，所以儘可能地在低於15℃的環境養殖。比重則以大 →

原裝進口 純天然有機海鳥糞磷肥

肥料登記證：高進磷1401號

土壤改良
(バットーグア)



天德牌

肥效持久

誠徵：經銷商、外務員
(目錄備索)

※進口二年多以來，承蒙各農會、改良場、梨山地區購買對照，使用結果證明肥效優異，本公司並將對照成果錄影存證，已有多種作物之成效卓著

※含有天然成分：磷酐 25%、檸檬酸溶性磷酐 14%、氧化鈣 32%及微量元素等，其酸鹼值 7.0-8.0之間，對土壤改良具有顯著之成效。

適用酸性土壤

台灣總代理 福光工業股份有限公司 TEL:(07)3126136~8高市三民區潼關街18號