



每6週青割一次最佳(溫秀嬌攝)

→ 4. 株植密度

行株距50~65公分×50公分為宜。

5. 施肥管理

每公頃施肥量應視土壤肥瘠，土壤質地，氣候條件及作物生長情形的予增減。肥力中等之壤土或砂質壤土，每年每公頃施用氮素900公斤~1000公斤，鉀肥每年每公頃施用K₂

O150~300公斤即可，磷肥每年每公頃施用P₂O₅144公斤。整地時將有機肥料（堆肥）和全量磷肥及1/2鉀肥、1/6氮肥（以年收割6次計算）施入土中當基肥。每次收割後7天施用1/6氮肥，每收割2次施用量1/2鉀肥（2次）為追肥。

病虫害防治

主要為莖線虫(Stem nematode)，夏季高溫多濕較易發生，其防治方法參照如下：

1. 土壤消毒

整地時撒施殺線草劑，以防治土壤中線虫等害虫。

2. 扦插枝條消毒

將扦插牧草切莖，浸於殺線虫劑Nemamort或Mocap乳劑5分鐘，撈起風乾即可種植。

收穫時期及利用

本品種以青刈鮮飼為主，生長旺季最適收割間隔每6~8週收割一次，青刈留茬高度約為離地面5~10公分。多雨季節，排水不良、積水地區或下大雨時最好不要青刈，以免莖基部與根部腐敗而缺株。以放牧為主者，不可過度放牧，以6~7週放牧一次為宜。 ❀

肥效長久 後勁十足



請認明商標

原裝進口 歷史悠久

土壤改良 最純正
最佳有機質肥料

泰國 蓖麻粕

含有成分：

氮 6%
鉀 1%
磷 2%
有機物 85%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司出品

台灣總代理 泰坦企業股份有限公司
請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社
經銷服務處：

(052) 541017 林木榮 (045) 874571 胡壽籃
(037) 663659 張金海 (089) 323997 鄒春菊