


		害，葉背面初呈現不明顯之灰微白色小斑點，不只生灰微。病斑初呈圓形後因葉脈阻止呈不正形，表面呈淡黃色背面轉為黃褐色至淡紫色，後期葉捲而枯死。	7天施藥1次。		黃秀華
葱韭	赤銹病	本病為害葉片及花梗，表皮稍有突起後縱裂露出黃色粉狀物為本菌夏孢子堆，一般氣溫涼爽時發病較多。	於發病初期可用下列藥劑防治：65%「鋅乃浦」WP400倍；85%「鋅乃浦」WP 500倍；50%「賜加落」WP 1500倍，每隔7~10天施藥一次。	47%「三得錳」WP施用時不得提高藥劑濃度以免發生藥害。	
	紫斑病	被害葉初呈現小型褐斑，漸擴大成紡錘形褐色病斑，邊緣為紅色，或紫色，上下二邊稍黃化。	於發病初期開始施藥，可用下列藥劑防治：65%「鋅乃浦」WP 400~500倍，75%「四氯異笨」WP 400倍。		



MELOBAC®

メロバック 水性微生物

特級 農神-M

(磷·鉀·鎂吸收促進劑)

商標第00361933號

歡迎來函索取目錄及微生物技術指導手冊

買活菌 找農神

微生物技術指導員 / 簡富裕

● 木瓜、瓜類、青仔、蓮霧有效 ●

農神活菌對蓮霧催花後的營養管理

蓮霧根部為了吸收三要素，必需排除有機根酸交換，而根酸會促使土壤酸化，固定營養元素，引發嗜酸性線蟲吸食。應灌注農神菌分解根酸，使營養元素溶出被根毛吸收，以提高生理營養濃度，增加抗寒，抗病能力，對後期著色及硬度效果很好。

(1) 基肥期：灌注農神菌500倍於基肥穴(溝)，使營養蓄積。

(2) 幼果期：灌注農神菌500倍一次。葉噴海藻精1000倍+磷鎂精1000倍+佳農收400倍。15天1次共2次。

(3) 吊鐘期、灌注農神菌500倍一次。葉噴腐植酸1000倍+磷鎂精1000倍+佳農收400倍。15天1次共2次。

* 草莓幼苗得疫病時，可用農神500倍配合普拔克800倍或利露滅銹錳400倍交替使用。

神農行 台中市西區昇平街22巷3號

農友信箱台中郵政2374號 電話:(04)3898288

屏東區：陳文炳 (08) 7891190