

台中地區

資料提供 / 台中區農業改良場

台中區農業改良場區內主要作物1~3月病虫害防治備忘錄

項目 (作物名稱)	有可能發生 之病虫害	症 狀	防 治 對 策	備 考	執筆
小 麥	大 螟	蛀食莖部使成枯心或白穗。	尚無推薦藥劑，可參照甘蔗紫螟，選用50%撲滅松1000倍或45%一品松1000倍防治之。		劉達修
芒 果	炭 疽 病	危害嫩葉、嫩枝，花穗及果實，葉片上出現近圓形稍凹陷褐色病斑，亦有部份病組織脫離，而形成立空洞者。果實自始謝始之小果收穫期皆可被害，被害幼果有時呈近黑色，稍凹陷周緣行潛伏感染。	43%喜賜貝芬W.P.1000倍，自開花期起每隔7天施藥一次，連續4次，結果每隔14天施藥二次，連續4次。 50%撲克拉錳粉劑6000倍，滿花後期開始，每隔7天噴藥一次，連續5-7次。	1.本藥劑試驗時加展著劑出來通CS-7 3000倍。 2.採收前6天停止施藥。	黃秀華
番 石 榴	粉介殼虫	成虫及若虫群棲於枝條、葉背及果實吸汁為害，並誘發煤病。	可選用40%滅火松800倍、50%普硫松2000倍、25%谷速松800倍、50%歐滅松1000倍，連續施藥2-3次。		劉達修
球 根 花 卉	根 蝨	為害種球引起腐爛，致地上部枯黃。	種球貯藏前及種植前選用佈飛松或普硫松2000倍或用45℃溫水處理30-60分鐘。		
豌 豆	白 粉 病	為害葉片、莖、花及豆莢初期呈灰白色小斑，以後病斑擴大成片狀，嚴重時滿佈全葉而黃化影響植株至劇。主要發生於多濕環境下，品種間抗感程度差異極大。	10.5%平克座乳劑4000倍，發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3-4次。	採收前6天停止用藥。	黃秀華
菊 花	薊 馬	為害花部，影響品質。	選用25.3%美文松1000倍、70%福文松2000倍，於花蕾期酌施1-2次。		劉達修
	蚜 虫	為害葉片、心芽、花部，主能誘發煤病。	發生蚜虫時選用90%納乃得3000倍、25.3%福化利15000倍或其他推薦藥劑一種防治之。		

(請接53頁)

(文接50頁) 台中區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄


菊 花	二點葉蟎	為害葉背，使葉片呈黃白色，提早枯黃、落葉。	選用38%得氯蟎1500倍、2.8%畢芬寧2000倍輪流防治之。	藥劑應噴到葉背才有佳效。	劉達修
--------	------	-----------------------	----------------------------------	--------------	-----

(文接51頁) 高雄區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄

毛 豆		部、嫩心及嫩莢。	乃得可濕性粉劑1500倍配合防治。		李平全
	野 鼠	在田間藏匿，食害植株及豆莢，產量受影響。	配合政府宣導滅鼠週滅鼠，若田間發現為害時用殺鼠劑防治。		

(文接52頁) 花蓮區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄

		葉表露出粉狀感，除葉部外，葉鞘、苞葉及雄花之分歧均可被害。	兩日後即須施藥。 2. 施藥時應噴於葉片上下兩面。		陳任芳
大 豆	潛 蠅	幼虫白葉部蛀入莖部，潛入根部為害，造成莖部硬化，根部變褐，受害嚴重時葉片黃化植株枯萎。	種植前施藥於溝畦中。		



工商服務

惠光

奉獻本省農業發展10餘年的惠光化學股份有限公司總經理陳榮木先生，由於平日對工作之盡心、研究與講信重義、造福鄉里，於今年同時獲得了中華民國第二屆農福「金禾獎」之十大傑出農業貢獻獎及中華民國國民

外交協會台南市分會會長兩項殊榮，可謂是雙喜臨門。不但是該公司之榮耀、更是陳先生努力有成之結果。

陳榮東先生致力農化業經驗豐富，對本省病虫害防治指導有功，造福農友收益。而陳先生自幼出身農村，除了對農

業具有特別情誼外，更對鄉土保有一分犧牲之精神；所以他的成功非偶然，並且勘為表率。

在此祝賀陳總經理之同時，並希望該公司更創新技術、服務大眾；也期許大家給他們多多打氣。(林嵩展)