

高雄地區

資料提供／高雄區農業改良場

高雄區農業改良場區內主要作物1~3月病虫害防治備忘錄

作物	病虫害種類	病徵或危害狀	防治方法	備註	執筆人
水稻	稻熱病	為害葉、穗、穗頸及莖節，在葉部呈紡錘型之病斑、在穗則穗不飽滿因該病蔓延很快所以常造成大損失。	①種值抗病品種 ②罹病秧苗不要移入本田 ③發生時使用75%三寶唑可濕性粉劑3000倍，或5%護粒松乳劑1000倍防治		李平全
	斑飛蝨	媒介傳播縞葉枯病並直接為害水稻，呈谷粒變黑不飽滿。	用40%布芬淨水懸粉2000倍在每穗發現1~2隻時防治。		
玉米	莖腐病	莖部靠地際部位腐爛而亡。	①土壤不宜過濕 ②玉米田須排水良好		
芒果 (Mango)	浮塵子	為害花蕊及花穗致落花、落果。並誘發煤病。	使用25%布芬淨可濕性粉劑750倍或50%達馬松液劑1000倍防治。		
	螟蛾	幼虫蛀入花梢或嫩梢使新梢萎凋，幼果脫落。	發生時用50%撲滅松乳劑1000倍或85%加保利可濕性粉劑850倍防治。		
楊桃	煤病	本病病原菌主要以浮塵子、介殼虫、蚜虫等類害虫分泌物為生之絕對寄生菌，因此虫害發生時，亦是本病發生時期。	果實5公分長時套袋；套袋時需將排水孔打開，袋口需緊密。		
	葉類	成若為害葉部、被害葉部變為枯黃之密集斑點、嚴重時葉片呈枯黃色造成落葉、影響植株發育。	本發生時使用21%得克乳劑1200倍每隔7天施藥一次，採收前15天停止施藥。		
蓮霧	果實蠅	在果實上產卵孵化後之幼虫食害果肉、致使果實腐敗。	①套袋 ②在果樹掛誘虫盒誘殺雌虫，內含有毒之甲基丁香油或有毒水解蛋噴於少數植株上		
毛豆	銹病	主要在葉片發生、也在莢及莖上發現、發生嚴重時葉片枯黃。	發生時使用45%銻錳乃浦400倍防治		
	薊馬	在葉和花上為害，致使落花落果，葉部粗糙畸形影響產量致鉅。	發生時使用賽洛寧1000倍或90%納乃得可濕性粉劑1500倍防治		
	甜菜夜蛾	產卵葉片上，孵化幼虫食害葉	使用性費格蒙誘殺和90%納		

(請接53頁)

(文接50頁) 台中區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄


菊 花	二點葉蟎	為害葉背，使葉片呈黃白色，提早枯黃、落葉。	選用38%得氯蟎1500倍、2.8%畢芬寧2000倍輪流防治之。	藥劑應噴到葉背才有佳效。	劉達修
--------	------	-----------------------	----------------------------------	--------------	-----

(文接51頁) 高雄區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄

毛 豆		部、嫩心及嫩莢。	乃得可濕性粉劑1500倍配合防治。		李平全
	野 鼠	在田間藏匿，食害植株及豆莢，產量受影響。	配合政府宣導滅鼠週滅鼠，若田間發現為害時用殺鼠劑防治。		

(文接52頁) 花蓮區農業改良場區內主要作物 1 ~ 3 月病虫害防治備忘錄

		葉表露出粉狀感，除葉部外，葉鞘、苞葉及雄花之分歧均可被害。	兩日後即須施藥。 2. 施藥時應噴於葉片上下兩面。		陳任芳
大 豆	潛 蠅	幼虫白葉部蛀入莖部，潛入根部為害，造成莖部硬化，根部變褐，受害嚴重時葉片黃化植株枯萎。	種植前施藥於溝畦中。		



工商服務

惠光

奉獻本省農業發展10餘年的惠光化學股份有限公司總經理陳榮木先生，由於平日對工作之盡心、研究與講信重義、造福鄉里，於今年同時獲得了中華民國第二屆農福「金禾獎」之十大傑出農業貢獻獎及中華民國國民

外交協會台南市分會會長兩項殊榮，可謂是雙喜臨門。不但是該公司之榮耀、更是陳先生努力有成之結果。

陳榮東先生致力農化業經驗豐富，對本省病虫害防治指導有功，造福農友收益。而陳先生自幼出身農村，除了對農

業具有特別情誼外，更對鄉土保有一分犧牲之精神；所以他的成功非偶然，並且勘為表率。

在此祝賀陳總經理之同時，並希望該公司更創新技術、服務大眾；也期許大家給他們多多打氣。(林嵩展)