


# 檸檬 主要病虫害之認識與防治(上)

高雄區農改場  
植物研究室助理研究員／李平全




鳳蝶及其為害狀

鳳蝶老幼虫



茶黃薊馬為害狀(花)



茶黃薊馬為害果實

**檸檬** 檸適於本省南部栽種，由於近年來價格還算穩定，農民尚可得到努力換來的合理利潤，所以高屏地區種植面積有增無減。檸檬是一種多用途的水果，因它含有豐富的維他命C，可以美容養顏；做成檸檬汁，加些糖和冰塊，在夏季喝起來，其滋味就像青年男女初戀的滋味一般，酸酸甜甜的，所以廣受一般消費者喜愛；又因它的味道芬芳，所以一般的休閒食品，還有洗潔精等常加些檸檬，聞起來芬芳撲鼻，滿室生香。檸檬是柑桔類的一種，很具草根性，一年四季都有得採收，這和一般柑桔類如柚子、椪柑、柳橙等一年一收有別；而病虫害種類及發生情形也因此略有不同，現描述於下，作為防治上之參考。

### 鳳蝶

屬幼虫為害，多發生在7~9月間，卵產於葉片，幼虫孵化後食害幼嫩葉片及心葉，食量大，老熟後化蛹於枝條上，裸蛹，易受天敵小


繭蜂等之寄生。蛹羽化後變成美麗的蝴蝶，發生該虫為害時可用90%納乃得可濕性粉劑1,500~2,000倍防治之。

### 銹婢

蟲體細小，需在放大鏡下方能看清楚，卵散生於葉背中肋處及幼果之蒂基部，孵化後為害葉片和幼果，而造成果皮粗糙呈暗褐色，俗稱象皮病，幼果形成時就開始危害，它的高峰期大約在3~6月和8~10月間。可用65%鋅乃浦可濕性粉劑1,000倍，或47%得拉松乳劑1,000倍，亦或24%歐殺滅溶液750倍防治。

### 茶黃薊馬

本虫週年發生，在乾旱季節發生較烈，開始時在花器內，幼果形成時銼破表皮細胞，並挿入口器吸收汁液。受害表皮壞死，隨果實長大而所產生之粗糙疤痕越大，影響商品價值頗大。發生時可用48.34%丁基加保扶乳劑1,000倍防治，但採收期21天內停止用藥。→




象皮病

## → 潛葉蛾

春季及夏季為發生盛期，幼蟲會潛入葉片組織內吃食葉肉，為害狀如畫圖狀，故俗稱畫圖蟲。尤其3年生以下之植株受害較重，被害葉嚴重時捲曲不展，影響枝條發育。防治方法可用50%馬拉松乳劑800倍，或44%大滅松乳劑1,000倍，或50%益滅松可濕性粉劑500倍，亦或50%歐滅松溶液1,000倍，擇一使用。

## 星天牛

成蟲咬破樹幹基部樹皮，產卵在裂縫內，孵化後幼蟲繞皮層內側盤食，後蛀入木質部，食害木質部並排出大量木屑於樹幹下，影響樹勢生育，甚至枯死。一年僅發生一代，成蟲約在4~7月出現為害。在4~5月間成蟲出現時，可用40.64%加保扶水懸粉100倍，每隔一個月將藥劑噴於離地面50公分以下之樹幹基部至8月止，施藥時應帶口罩、手套以防藥液沾到皮膚及吸入體內。或在發現為害孔時用鉛線伸入孔內刺死幼蟲，或直接用棉花沾加保扶藥劑10



星天牛為害樹幹基部樹皮

~50倍塞入洞內並封住為害孔，虫子將毒餌於孔內。亦或成蟲出現前在樹幹離地面1公尺高處塗佈石灰乳或包紮塑膠布或網，以防產卵。

(下期續)

## 商服務

煥坤

致力本省園藝資材研究開發的煥坤企業股份有限公司，在造福農友之同時亦不忘記從事於精神藝術的追求，讓消費大眾享受該公司努力經營之成就。

全國第一家紙藝品專售店的「卡迷文化公司」已於80年9月4日在台中市成立，身兼煥坤企業與卡迷紙藝世界的郭獻鐘董事長，除對本省農業發展具有一股強烈的工作使命感外，更重視精神生活的充實。基於自幼對摺紙藝術之熱愛，乃融合了剪紙、紙雕、立體卡片

、摺紙材料於一爐，以立體化與栩栩如生的應景下，也能讓消費大眾興起一股自己動手做的慾望。而郭先生亦強調紙藝世界裡特別引進歐、日、美各國之紙藝材料，不論是在花卉或是生物、造園景觀上，均有別於一般的紙藝店之規模，琳瑯滿目、美不勝收。

不論是農民或是消費者，不妨闔府攜眷前來，讓大家在紙藝的天地裡發揮您的創造力與想像力，那時個中之滋味也就更具價值。卡迷紙藝世界隨時歡迎您，電洽：(04)

3750411。(林嵩展)

由杜邦公司農業部所繪編的「杜邦農訊」，為答謝全省農友對本刊雜誌之愛顧，特於八十一年度開始在內容上增闢一項「使用杜邦農藥經驗談」專欄，讓全省農友在使用該公司之產品後，能發表自己的心得；並藉此機會提供決策方向及技術改進之參考。

農業產品部謝繼瑞先生強調願結合全省農友之智慧，共同來解決農業之間題，歡迎全省農友多加利用。(林嵩展)