



設施內遮光與無遮光的比較

很容易乾燥，因此早、晚必須適度澆水，以噴灑最為理想，秋季以後播種者一天澆水一次或隔天澆水均可，但需保持土質濕度，以促進發芽或生長發育。本省夏季常有豪雨，田間如積水或過分潮濕，易引起根部濕害，影響生長，因此排水亦為重要工作。

病虫害防治

芫荽因具有較特殊之味，一般病虫害發生種類也較少，主要有蚜虫，夜盜虫。蚜虫可用10%畢芬寧可濕性粉劑稀釋4,000倍或50%達馬松溶液稀釋1,200倍。夜盜虫可用10%百滅寧乳劑稀釋3,000倍或25.3%美文松乳劑稀釋500倍加以防治。

採收

播種後開始發芽至採收，約需40~45天，

幼苗生長至8~10公分時，播種太密的，可先疏去密生部份之苗供食用，一般在抽苔前需採收，芫荽採收，必須保持新鮮，因此栽培地點多半靠近市近郊，以便利運輸，才不致失去新鮮品質。



贈書啓事

本社出版之「鄉間小路」月刊，各地農會若欲作為舉辦活動之贈品，請來電接洽（電話：02-3628148），請洽簡經理。又，僅限過期雜誌）