

	輪紋病	於果實形成圓形水浸狀腐爛，呈同心輪紋排列，於枝條形成瘤狀凸起，或裂開之病斑。	1.清除病果及受感染，尤其出現瘤狀物之枝條。 2.高接梨於4月底以前，橫山梨於6月底以前完成套袋。套袋前間隔10天施用 Topas E. C. 2~3次。	葉俊巖
	赤星病	於葉面形成黃色凹陷病斑，於下表面相對位置形成絨毛狀凸起病斑。	1.參考黑星病之用藥及方法。 2.避免於果園附近三公里範圍內栽培龍柏。	
瓜類 (洋香瓜) (西瓜)	苗腐病	苗地際部水浸狀縊，倒伏，枯死。植株地際部，藤蔓形成水浸狀縊縮，葉片受害則呈水浸狀腐爛。	1.使用透水性較佳之育苗介質。 2.播種後立即施用立枯靈 1000 倍液，或伊得利 1000 倍液，或於覆蓋土添加 500 倍之鋅錳滅達樂粒劑。	
	疫病 露菌病	植株地際部、藤蔓形成水浸狀縊縮，葉片受害則呈水浸狀腐爛。	發現病症時，離地際部施伊得利1000倍液，每株300~500cc或5%鋅錳滅達樂粒劑，每株10~20公克施於表土。	
瓜類 (洋香瓜) (西瓜)	蔓枯病	於葉面形成黃色角形受限於葉脈之病斑，相對下表面形成黑色或褐色粉狀物。	病斑開始出現時施用鐵鋅錳乃蒲，鋅錳克絕，或鋅錳滅達樂，免得克絕等任何一種藥劑均可。須着重葉下表面施藥，並添加展着劑。	
		於地際部或藤蔓或形成水浸狀而後出現流膠，或白色表面乾燥且密佈黑色小點之病斑，藤蔓迅速枯死，且一開始即為永久性萎凋，而與蔓割之初呈暫時性萎凋。	1.種子必須消毒，使用Benlate-T 5000倍液或Topsin-M均可，消毒後須用冷開水洗淨，後再播種。 2.於地際部出現灰白色龜裂，斑塊之苗不可使用。 3.發現病株時施用依滅列，或貝芬寧或得滅寧可濕性粉劑，任何一種均可，須加CS-7展着劑並着重地際部施藥。	

註：其他作物的病虫害防治方法，請參閱 41 卷 9 期

農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



- 適用於：
莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類
- 用途：
防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收
- 大量減少農藥使用次數

- 主要產品：
花網／瓜網／芹菜網／蘭草網／豌豆網／防鳥網
洋香瓜地面網／甜椒網／蕃茄網／辣椒網／絲瓜網／
葱網／大蒜網／蘆筍網／茄網／萬年青網
- 其他主要產品：漁業養殖籠／運動網／安全護網

欣隆製網股份有限公司

工廠：台南市新豐里新豐路174-1號

電話：(04) 524625-613567

傳真機：047-611750