

項 目 (作物名稱)	可能發生 之病虫害	症 狀	防治對策	備考	執筆
蔬菜	斜紋夜盜蛾	雌虫產卵於葉背，一百至數百粒成一卵塊，上覆母虫之暗黃色尾毛。幼虫群集啃食葉背葉肉，二、三齡後分散，老熟幼虫藏匿於土中夜出為害，本虫食性其雜，一般農作物多受其害。	用 2.8% 畢芬寧乳劑或 2.8% 賽洛寧乳劑加水 2,000 倍，於幼虫發生時開始施藥，每 7 天施藥一次，採收前 9 天停止施藥。		江正直
	小菜蛾	年發生15至21世代左右，繁殖迅速，幼虫活潑。受驚時常吐絲下垂，常出葉背取食而殘留上表皮，被害心葉及葉片點點成孔。老熟幼虫在葉上或葉背結繭化蛹。	防治本虫之推廣藥劑種類繁多，請注意各種藥劑之安全採收期。 (使用藥劑可參照植物保護手冊)		
芒果	白粉病	本菌一般危害花穗及幼果果柄，開花時期被害部呈現白粉狀，不久被害部轉黑色而引起落果，本病以被害部着生之分生孢子來傳播。	以25%布瑞莫乳劑加水2,000倍，或25%依瑞莫水懸粉加水1,500倍於開花初期起，每隔10天施藥一次至幼果形成期為止約2-4次，加展着劑。		

註：其他作物的病虫害防治辦法，請參閱41卷9期。

農神棒棒·棒棒農神!! 菌種安定·絕不膨罐!!




MELOBAC®

◎經濟部工廠登記證◎

NO. 99-161694-00

農神



Super Bark

(樹皮精)

肥料登記證：北進複字07601

- ◎內含10支菌群，厭氣性與好氣性互補，經(chain-reaction)環環相扣，可克服各種酸化及鹽類障礙之土壤。
- ◎10支菌群中，包含3支溶磷菌，可有效分解磷肥，促進磷、鉀、鎂之吸收。
- ◎經過長期醱酵、馴化，菌種安定，密度高，活性好，絕不膨罐。
- ◎非酵母菌、酵母粉泡水稀釋，歡迎比較。

- ◎來自印尼熱帶原始森林的樹皮與海中藻類，經過長期腐熟提煉而成。
- ◎樹皮精含有纖維素、果膠質、天然輔酶及激素。
- ◎樹皮精可快速修補病蟲害入侵的葉片組織，促進光合作用，以增強抗病力。
- ◎對於茶葉、菸葉及葉菜類，可提供纖維素及果膠質以提高品質，效果特佳。

一利®補	綜合微量元素(英國)	500公克	2500倍	零售價
一利®鎂	即溶性鎂素(英國)	500公克	2500倍	零售價
一利®旺	腐植酸+海藻精+NPK	500cc.	1000倍	零售價(特殊配方、雙效合一)
海中極品	快速溶解海藻精(挪威)	1公斤	4000倍	零售價

▲郵政劃撥帳號：0286577-6 鄭夙芬

●歡迎各鄉鎮農藥行洽詢

國立中興大學園藝系67級畢業
微生物技術指導員 簡憲裕



神農肥料加工廠

公司：台中市西區昇平街22巷3號
TEL：(04) 3898288